شبكة الألوكة
www.alukah.net

مكتبة غازي خسرو بك

مخطوطة

كتاب في علم النجوم

المؤلف

مصطفى بن يوسف بن مراد (الموستاري)

ملاحظات

- نقص أوله.
- ينقص من هذا الكتاب المقدمة والمبحث الأول، والله أعلم.

شبكة الألوكة
www.alukah.net

تقسيب الماء بالتدريج على النسبة اليها وايضا لا يمكن بوجه
بعض السطح الظاهر من الماء الى مركز العالم وبعد الآخر عنه لانه
لو كان كذلك لمال الماء العالي الى الموضع الغائر ليسلك به الى ان يتشابه
احد اسطحيه من المركز فاذن يكون سطح الارض والماء كريين
اذ لو كانا مسطحين لامتنع وقوع هذه الامور عليها واما
على كرية الهواء فلان ما بين السطح المستدير المحيط بالماء والارض
وبين مقعر السطح المستدير للنار مملوء بالهواء لاستحالة الخلاء
فبالضرورة يكون السطحان المحيطان بالهواء مستديرين وكذلك
نقول في كرة النار وما يليها من التضاريس والتلال والوهاد
في سطح الارض المخرجة اياها من ان تكون كرية فهي ليست من
طبيعة الارض بل لاسباب عارضة له مع انها لا تقدح في كريتها
ولا عبرة بها اذا نسبتها الى مجموع كرة الارض لانه عرف بالمشاهدة
وستقف فيما ان نسبة جبل مثلا يكون ارتفاعه فرسخا وثلثا
الى كرة الارض كنسبة سبع عرض شعيرة الى كرة قطرها ذراع
تقريبا فسطح الارض والماء اعني مجموعهما كرة واحدة بالمقعر الفلك
المحيط به وكذلك الاجوبة عما قيل في كرة الماء ومقعر الهواء ثم
الامر مجدد به في كرة النار ان ثبت انها ليست عنصرا اصليا بل كانت

ناشية عن حركة الفلك ثم كل واحد من العناصر غير الماء طبقات إما
كل من النار والارض طبقتان واما الهواء فثلث طبقات

البحث الثاني

في بيان المحركين الاولين وكيفية تقسيم الفلك الثامن بالبروج
الاثني عشر اعلم ان لكل فلك من الافلاك حركة بل غذاء واذ مشاهدة
اختلاف حركات كل كوكب ملزوم لاختصاص كل فلك بحركة خصة
لكن حركاتها مع كثرتها منحصرة في جهتين اما من المشرق الى
المغرب وهي المسماة بالحركة الاختلاف التوالي او بخلافها وهي المسماة
بالحركة اليا التوالي اما القسم الاول فالاصل فيه حركة الفلك
الاطلس المسمى بحركة الكل وهو جسم كري يحيط به سطحان متوازيان
احدهما محدب وقد عرفته والثاني ماس لمحدب الفلك الثامن
مركزهما مركزه يتحرك بما في ضمنه من الافلاك اما لانه جزء
منه او لان متحركه مكان له او لقوة نفسه على خلاف التوالي
في اليوم بليلته دورة تقريبا على محور ثابت وقطبين كذلك
بهما قطبا العالم وقطبا الحركة الاولى يسمون احدهما بالشمالي والاخر
بالجنوبي ومنطقة هذا الفلك بداية معدل النهار لاعتدال المائلين
عند وصول الشمس اليها ساعة طلوعها او غروبها في جميع الآفاق معا
الافق الرحوي ومنطقة الحركة الاولى اذ هي المدركة لنا اولا والاثير متحرك

بظهورها في الكواكب المتحركة بها على نسق واحد في اليوم بليلته
دورة تقريبا بموازاة لهذه المنطقة فلزم ان يكون حركة
واحدة ويسمون اجزاءها الثلثمائة وستين اياما والدوائر المرسومة
من كل نقطة معروضة على هذا الفلك بالحركة اليومية الموازية
لمنطقته في شمالها وجنوبها المدارات اليومية فكل كوكب يدور بحركة
الكل في سطح واحد منها واما القسم الثاني فالاصل فيه حركة
الفلك الثامن للثوابت وهو ايضا جسم كري يحيط به سطحان متوازيان
الاعلى منهما ماس معتدل الجاوي والادنى ماس لمحدب فلك زحل
ومركزهما مركزه اعني مركز العالم يتحرك بما في ضمنه على التوالي
حركة يختلفون في كميتها فقالوا انه يتحرك في كل مائة سنة شمسية
او في ستة وستين سنة منها او في سبعين سنة درجة على قطبين
ومحور ثوابت مائلة عن القطبين والمحور المذكورة قاطع احد
المحورين الاخر عند مركز العالم على زوايا حادة ومنفرجة و
يسمون منطقته منطقة البروج ودوائره ودوائرها وقطبيها
بقطبي البروج والدوائر المرسومة على سطح هذا الفلك بحركته الموازية
لمنطقته بالمدارات العرضية وحركته بالثانية لانها لم تعرف
ابتداء بل بالنظر والاستدلال بحركة الكواكب وهذا في العصر بعد

شبكة الألوكة
www.alukah.net

والستين
الاجتماع ظاهر واحد آراءه الثلثمائة بل درج السوار واذا احدث من تقسيمها
العالم في المركز كلها دوايرو سطحها يسمون كل واحد منها بالممثل المماثلة
او الاطلاك كلها
فلك البروج ويطلق على ما حدث في الحد ايضا فلك البروج تحقيقا
بالمركز والجهة والتقاطع المنطقة
والشمس تلازم سطح هذا الحادث وهو مقاطع لمنطقة معدل النهار
في جميع الافلاك المحركة بالحركتين على نقطتين متقابلتين وزوايا حادة
ليسمون احديها وهو مجاز الشمس الى البروج الشمالية الاعتدال الربيعي
والاخرى وهو مجازها الى الجنوبية الاعتدال الخريفي واذا توهم
دايرة عظيمة منصفة للعالم مارة بالاقطاب هذين الفلكين
فهي تقاطع فلك البروج على نقطتين متقابلتين وزوايا قائمة عند
غايتي ميله عن المعدل يسمون الشمالية منها بالانقلاب الصيفي والجنوبية
بالشتوي والدايرة بالمارة بالاقطاب الاربعة وبها يعرف غاية الميل
بين المنطقتين فهي داخلة تحت تعريف الميل الاول والثاني وسموه
وقطباها نقطتا الاعتدال والقوس الواقعة منها بين المنطقتين
او القطبين في الجهة الاقرب هي الميل الكلي وما بين قطب احديها
ومنطقة الاخرى تمامها وكذا اذا توهم عظيمة اخرى تمر بقطبي
البروج وبنقطتي الاعتدال تربع فلك البروج اربعا متساوية فنقض
على ربع واحد منها نقطتين بحيث يكون بعد احديهما عن الاخرى مثل بعد
حرارته

عن اقرب طرفي الربع وكذلك نفوض في ربع آخر منها مجاور للربع
المذكور فتوهم اربع دوايرعظام تمر بالنقاط المفروضة وبقطبي
البروج فبالضرورة تمر هي باربع اخرى على الزاويتين الاخرتين
مقابلة للاولى المذكورة فينقسم
دايرة البروج بالدوايرالستة اثني عشر قسما متساوية
كل قسم محصور بين نصفي
دايرتين اعظم فلك او من
نصفي المنطقة بحسب ما اشاؤها الماخوذة
من توهم خطوط التواب مشهورة وهذه صورة نصف فلك البروج على السطح
ومن قطع سطوح هذه الدوايرانقسم الافلاك المحيطة بالارض كلها باثني
عشر قسما متساوية يسمى كل قسم منها محصورين كل نصفين منها اما
من الفلك او من نصفي المنطقة بحسب ما اشاؤها واما حركات الافلاك الباقية
الشاملة للارض فبعضها الى خلاف التوالي وبعضها الى التوالي ايضا مثل
الحوامل والكرات الممثلات المتحركة بالحركة الثانية المستلزمة لحركة
الكرة الاوجات والحضيضات اليه وسيظهر عليك الكل

المبحث الثالث في ذكر الدوايرالعظمى والصغرى وبيان التي منها تغرب

الثابتة اما منطقة معدل النهار ومنطقة فلك البروج والدايرة
المارة بالاقطاب الاربعة فقد مر ذكرها واما دايرة الميل
الاول فهي عظيمة تمر بجزء ما من فلك البروج غير المنقلبين او
بكوكب ما وبقطبي المعدل وما وقع منها بين الجدي او الكوكب وبين
دايرة المعدل من الجهة الاقرب فهو الميل الجزئي لها وبعد الكوكب
والميل الاول ايضا وتمام هذا الميل يبعده عن القطب الاقرب للمعدل
فالمارة باول الثور ميل الحمل وباول الجوزا ميل الحمل والثور معا
وكذا في البروج كلها والمراد بالميل اذا
اطلق هذا الميل وهذا شكله واما
دايرة العرض وقد تسمى
دايرة الميل الثاني فهي عظيمة مارة
بجدي او كوكب ما وبقطبي البروج قاطعة
لفلك البروج على قوايم وما بين الجدي
او الكوكب اعني طرف الخط الخارج من مركز العالم الى فلك
البروج مارا باحدهما وبين فلك البروج في الجهة الاقرب
منها عرضه وتمام العرض بعد ما بين الجدي او الكوكب والاقرب
قطبي البروج فهما نان الدايرتان تتحدان معا عند غاية
الميل

الميل بالدايرة المارة بالاقطاب الاربعة ثم اعلم ان طول
الكوكب وقد تسمونه تعويلا ايضا عبارة عما وقع من فلك البروج على
التوالي بين الاعتدال الربيعي وبين مركز الكوكب او النقطة الاقرب
الحادثة من تقاطع دايرة عرضه فلك البروج فالثلثة الاولى
من الدوايز الخمس المذكورة التي لا يلاحظ فيها السفليات
نوع كل منها منحصر في شخصه واما اشخاص كل نوع من الباقيين
فغير متناهية واما دايرة الافق فهي اما حقيقية
وهي العظيمة التي تمر بمركز الكل وتنصف العالم واما حسية
وتسمى بالافق المدبر والشعاعي ايضا وهي الموازية للحقيقية
الفاصلة بين الظاهر من الفلك للابصار والخفي منه عنها المارة
بطرف قطر الارض الذي نصفه هو البعد بين الافقين فهو مر مركزها
وقطباها هما سمت الراس والرجل وهي تنصف منطقة المعدل حيث
لم تتحد به على نقطتين متقاطرتين تسمى لاحداهما نقطة المشرق
ومطلع الاعتدال ووسط المغارب وللاخرى نقطة ومغرب الاعتدال
ووسط المغارب والخط المستقيم الواصل بينهما على سطح الارض خط
المشرق والمغرب وخط الاعتدال والاستواء وللدوايز
الصغار الموازية لها من فوق او تحت مقنطرات الارتفاع

او الاخطاط وكذا تنصف منطقة البروج على نقطتين ايضا ينتهي
للشرقي منهما درجة الطالع وتدعى والغربي درجة الغاربة و
وتد التابع ولما كان الطلوع والغروب يعرفان بالنسبة الى الافق
الحسي فهو ينقسم الى افق خط الاستواء والرجوع والمايل لان
الخط الخارج من مركز الافق عمودا على سطحه ذو الجهتين الى
مجذب المحددان انتهى ليسمى فهو الزوال والدور هناك
دولابي لتقاطع سطح الافق وسطوح المدارات اليومية على
قوايم ولذلك سمي افقه بافق الفلك المستقيم والكرة المنصبة
وان انتهى الى قطبيه فهو الثاني والدور رحوي لانطباق
المعدل على الافق وانتصاب محور العالم على سطحه وان انتهى
الى ما بينهما فهو الثالث والدور حايلي لتقاطعه المدارات على
حادة ومنفرجة وميل المعدل عن الافق في جهة القطب المخفي
وميل الافق عنه في خلاف تلك الجهة ولذلك يسمى اما مقنعا بالمايلة
واما دايرة نصف النهار فهي عظيمة تمر بقطبي المعدل
وقطبي الافق ونصف المعدل والمدارات اليومية والافق والمقنطرات
كلها قايمة عليها على قوايم فهما تمران بقطبيها وبمقنطرا المشرق
والمغرب ويسمى موضعا تقاطعها الافق على نقطتين متقاطرتين

بنقطتي الشمال والجنوب والخط المستقيم الواصل بينهما يخط نصف
النهار والمغارب والجنوب وكذا تنصف فلك البروج وتقطعه ايضا
على نقطتين متقابلتين تسمى التي فوق الارض بدرجة وسط السماء
وهو بيت العاشر وهو التي تحتها بدرجة الرابع ووتد الارض وتنفصل
بين النصفين الشرقي والغربي من الفلك بالصاعد والهابط
بتقاطعها بالحركة اليومية في الاقاليم الغير الرجوحية ما وقع من
محيطها بين المعدل او قطبه وبين قطب الافق او محيطه في الجهة
الاقرب هو عرض البلد وهو بعينه كارتفاع اقرب قطبي العالم
الى البلد وما بين قطبيها او محيطيها بلا توسط منطقة او قطب
تمام ذلك العرض واما دايرة اول الثمرات وتقابل لها دايرة
الارتفاع اذا تحدث بها لم يكن لها مقنطرات سمت في جهة عنها
وهذه الدايرة حيث تماس مدارا يوميا في الافق المايلة على نقطة
سمت رأس سكان بلد فهو مدار ذلك البلد ثم الفلك ينقسم بهذه
الدوايرالثلث ثمانية مثلثات متساوية اربعة منها ظاهرة والباقي
مخفي اضلاعها ارباع الدور قطب كل دايرة من البلث يكون على
زاوية من زوايا مثلث منها وقطب كل ضلع من مثلث على زاوية
يوتر ذلك الضلع واما دايرة وسط سماء الدويرة

ويقال لها دايرة عرض اقليم الرؤية ودايرة انحراف منطقة
البروج على الأفق ايضا فهي عظيمة تمر بقطبي البروج والافق
فقطباها تتقاطع محيطيها وتنصف النصف الظاهر والخفي
من فلك البروج وما وقع منها بين دايرة البروج وقطب الافق
أو بين قطب البروج ودايرة الافق من الجهة الاقرب فهو عرض
اقليم الرؤية وما بين قطبيها أو منطقتيها بعد الوسط المذكور
تمام ذلك العرض واما دايرة الارتفاع ويقال لها الدايرة
التسمتية فهي عظيمة تمر بقطبي الافق وبنقطة مفروضة من
الفلك أو بدرك كوكب اعني بطرف الخط الخارج من مركز العالم
الى سطح الفلك الاعلى المار بايهما كان وتقطع الافق على قوايم بنصفين
عند نقطتين متقابلتين مشتملتين على دايرة الافق حسب ارتفاع
النقطة والكوكب اذا بخطاطه يسمى كل واحدة منهما نقطة التمت
والخط المستقيم الواصل بينهما خط التمت وغاية الارتفاع حيث
يبلغ الكوكب نصف النهار الذي هو الاوج الافقي الرجوي بالحركة اليومية
والقوس الواقعة منها بين النقطة أو مركز الكوكب ودايرة الافق
هي ارتفاع الكوكب ان كان احدهما فوق الارض والا فهو انحطاطها
ما لم يكونا على الافق وما بين ايهما كان وبين سمت الراس

او الرجل تمام الارتفاع او الانحطاط او الحقيقة والارتفاع
المذكور عبارة عن العمود النازل من مركز الكوكب على سطح الافق
الموازي لجيب قوس الارتفاع التي فيما بين الافق وطرف الخط المار

بمركز العالم او الكوكب ان لم يكن الكوكب
على سمت الراس والا انطبق العمود على
الجيب وهذا شكله ثم اعلم انه اذا فرضت
قوس من دايرة الافق بين فلك البروج و
بين دايرة الارتفاع في الجهة الاقرب منها من الطالع واذا فرضت
بين نصف نهار بلد وبين دايرة عظيمة مارة بروس اهل البلد
واهل مكة في الجهة الاقرب منها قبلة ويسمى بيانه واذا فرضت
بين نقطة التمت ومطلع الاعتدال او مغيبه في الجهة الاقرب
تسمى قوس التمت وما بينها وبين نقطة الشمال او الجنوب تمام قوس
التمت فمن التمت شرقي وغربي شماليان وكذا شرقي وغربي جنوبيان
وهذه الدايرة تتحد بدايرة نصف النهار في اليوم بليلة مرتين في نصف
زماني ظهوره وخفايه وبدايرة اول التمت حيث لا يكون للكوكب
سمت وبدايرة وسط سماء الرؤية اذا كان الكوكب على تربيع الطالع
وكل من هذه الدوايرة الخمس المذكورة نوع وله اشخاص كثيرة كدايرة

الميل والعرض فهذه هي المشهورة بين الدوائر العظام

الفصل الثاني في بيان التي قدمنا ذكر بعض منها

والباقي هذا اما طول البلد فهو قوس من معدل النهار فيما بين دائرة نصف نهار ابتداء العمارة وبين اما جزء من الخالدات او من سائر الدوائر التي تمر بالقطبين وتقطع معدل النهار على زوايا قائمة كالدائرة التي تمر بالسمت ومركز الشمس عند بلوغها احد الجوزهرين فان كان ذا عرض فموقع الطرف بالضرورة اما شمالي او جنوبي وحينئذ فما بين نقطة الرأس عند البلد ونقطة تقاطع دائرة العرض المارة بطرف الخط مع فلك البروج هو وسطه اما اذا فرضنا الخط المذكور مارا بمركز الكوكب فما بين اول الحمل الى طرف الخط وهو عديم العرض او بينه وبين نقطة التقاطع المذكور وهو ذو عرض تقويم الكوكب وتفاوت ما بين الوسط والتقويم من دائرة البروج هو تعديله ان لم يكن الكوكب في الذروة والحضيض واما اختلاف منظر الكوكب وهو قوس من دائرة الارتفاع واقعة بين راسي الخطين الخارجين احدهما من موضع الناظر الى الافق المدني والآخر من مركز العالم الى الافق الحقيقي الى فلك البروج المارين بمركز الكوكب المتقاطعين عليه وهي محسوسة فيما دون فلك الشمس وفيه ايضا لكنه قليل لا في قدر ما وراءه اذ ليس لجرم الارض بالنسبة اليه

ما دامت صاعدة حساوله عند الاوج والحضيض اذ لا تعديل ثمة واما وسط الكوكب فهو قوس من فلك البروج بين اول الحمل وطرف الخط الخارج من مركز العالم الى فلك البروج مارا بمركز تدوير وذلك عند بلوغه احد الجوزهرين فان كان ذا عرض فموقع الطرف بالضرورة اما شمالي او جنوبي وحينئذ فما بين نقطة الرأس عند البلد ونقطة تقاطع دائرة العرض المارة بطرف الخط مع فلك البروج هو وسطه اما اذا فرضنا الخط المذكور مارا بمركز الكوكب فما بين اول الحمل الى طرف الخط وهو عديم العرض او بينه وبين نقطة التقاطع المذكور وهو ذو عرض تقويم الكوكب وتفاوت ما بين الوسط والتقويم من دائرة البروج هو تعديله ان لم يكن الكوكب في الذروة والحضيض واما اختلاف منظر الكوكب وهو قوس من دائرة الارتفاع واقعة بين راسي الخطين الخارجين احدهما من موضع الناظر الى الافق المدني والآخر من مركز العالم الى الافق الحقيقي الى فلك البروج المارين بمركز الكوكب المتقاطعين عليه وهي محسوسة فيما دون فلك الشمس وفيه ايضا لكنه قليل لا في قدر ما وراءه اذ ليس لجرم الارض بالنسبة اليه

قدر معشور لاتجاد دراى الخطين المذكورين
حينئذ ويسمى الزاوية الحادثة حين
تقاطع الخطين على مركز الكوكب زاوية
الاختلاف ولا يكون للكوكب اختلاف
منظر اذا كان على سمت الرأس لكنه يزيد
كلما قرب الى الافق وغايته عند طلوع الكوكب وغروبه وشكله هكذا

واما سعة المشرق والمغرب فكل منهما قوس من دايرة الافق
ما بين مطلع الاعتدال او مغيبه وبين مدار الكوكب ولما كانت
المدارات اليومية موازية لمعدل النهار فسعة مشرق كل كوكب
مساوية لسعة مغربه وكلاهما في جهة الكوكب وسعة مشرق
كل جزء مساوية لميل ذلك الجزء عن افق خط الاستواء وبيانه في غير
تزيدان بزيادة عرض البلد فحيث يصير العرض مساويا لتمام
الميل الكلي يبلغ سعة مشرق الانقلابين تسعين جزءا وتتعرفه

واما قوس نهار الشمس وقوس نهار الكوكب فكل واحدة قوس
من مداره فوق الارض بين نقطتي مشرقه ومغربه والقوس
الاخرى من ذلك المدار بعينه تحت الارض بينهما قوس ليله ولما
تعديل نهار جزء من فلك البروج وهو نصف ما بين قوس النهار

المعدل

المعدل للشمس او الكوكب وبين النهار الغير المعدل اعني الفضل بين مطالع
ذلك الجزء بافق الاستواء وبين مطالعه ايضا لكن بالافاق المايلة هو
قوس من معدل النهار بين افق المشرق ونقطة تقاطع دايرة
ميل الجزء المذكور مع معدل النهار مثلا اردنا ان نعرف تعديل
نهار اول الجوزاء افق من الافاق المايلة وهو على افق المشرق
نفرض دايرة ميل تمر به فبالضرورة تقطع معدل النهار على
نقطة تحت الافق ويحدث مثلثا احد اضلاعه قوس من داير
ميل اول الجوزاء وهي بين المنطقتين تحت الافق والباقيان
بين اول الحمل ودايرة الميل احدهما من فلك البروج والثاني
من المعدل وهو مطالعه لكن بخط الاستواء وافق البلد
المايل بجعله مثلثين ظاهرا او خفيا فاحد اضلاع الخفي ضلع
المثلث الاول بعينه المشترك بينهما وهو القوس المذكور من دايرة
الميل وثانيهما سعة المشرق وهي بين المنطقتين وهذا ايضا
مشترك بينهما وثالثهما بعض من الضلع الثالث للمثلث الاول
اعني مطالع الضلع الثاني منه وهو قوس تحت الارض بين الافق
ونقطة التقاطع المذكور وهي المراد ولما كان اختلاف عروض
الافاق المايلة للبلدان ملزوما لاختلاف قطعها المثلث الحادث

اولا وجب ان يختلف المطالع بالكم فنزيد قوس تعديل نهار الجزء
مدة وتنقص اخرى واما الدايرة من الفلك بالنهار او الليل فهو قوس
من دايرة مدار الشمس او من دايرة مدار نظير جزء ما فيما بين
جزء الشمس ونظيره المذكور وافق المشرق وما بين الجزء ودايرة
نصف النهار هو فضل الدايرة ويطلق على الاول الدايرة من لدن
طلوعها وعلى الثاني الدايرة من لدن غروبها وما هو معتبر من مقدار
هذه القسي الست اعني قوس نهار الشمس وقوس نهار الكوكب
الدايرة بالنهار وقوس ليليهم شيئهما من معدل النهار واما
النطاقات فاعلم ان منطقة التدوير هي المرتسمة من مدار مركز
الكوكب وهو فلك صغير شامل للارض مركوز في ثخن الحامل مفروض
فيه بحيث تساوي قطره ثخنه فيماس بمنطقتين من سطحي جذب
الحامل وتقعره يسمى البعد عن مركز العالم ذروة التدوير
والاقرب حضيضه فان كانتا طرفي خط خارج من مركز العالم اليهما
فهما الذروة والحضيض المريتان وان كانتا طرفيه وهو خارج من
مركز معدل المسير او نقطة المحاذاة وتقعره فهما الوسطيان
فاذا تحرك هذا الفلك فحركة النصف الاعلى منه اما ان يكون على التوالي
فحركة النصف الآخر يكون على خلافه وذلك في تداوير الخمسة المتحيرة
ولما

واما ان يكون بالخلاف وذلك في تدويري القمر
الخارج المركز ويسمونه غير فلك الشمس والحامل ايضا الحامل التدويري
المرتسمة من مدار مركز التدوير والشمس وقد قسم كل منهما باربع
في كل اثنين منها اما علويان او سفليان متساويتان سميت كل
واحدة منها نطاقا واختلف في مبدا النطاق الثاني والرابع لاجل
من اعتبر البعد والمسافة عن مركز العالم قسم منطقة التدوير
بخطين يخرج احدهما من مركز الخارج المركز ماز بالحضيض ومركز
وبالذروة والآخر ينقطع التقاطع بينهما ومنطقة الخارج وقسم

وكم منطقة الخارج المركز بخطين ايضا احدهما من مركز العالم الى
الاوج والحضيض والآخر بحيث ينصف ما بين المركزين الى
البعدين الاوسطين وبهما منتهى حيث يتساوى الخطان الخارجان احدهما
من مركز الخارج والآخر من مركز العالم المنتهيان اليهما ومتى اعتبر
اختلاف مسير الكوكب قسم التدوير بخطين يخرج احدهما من مركز الحامل

وتميز بالذروة والحضيض والآخر يقوم عليه وينتهي طرفاه الى

نقطتي التماس بين محيط التدوير وبين خطين يخرجان اليه من مركز

الحامل وهناك هذا التعديل يكون بذروة العاية وقسم الخارج المركز

خطين اصلهما من مركز العالم الى الاوج والحضيض والآخر لبعد

كيف يكون زاوية التعديل اعظم اعني من جانبي الاوج على بعد تعيين

درجة عنه من اجزاء منطقة البروج وهذه صورتها



واما بيان القسي التي تتعلق بالقمر فمنها وسط الجوزهر

وهو قوس من الممثل على خلاف التوالي بين اول الحمل ونقطة الراس

وتعديله وهو قوس بينها منه لكن على التوالي ومنها

اوج القمر وهو قوس من منطقة المايل على التوالي بين النقطة الثانية

المحاذية لاول الحمل ونقطة الاوج ومنها مركزه او بعد الحضيض

وهو قوس من المايل على التوالي بين اوجه وطرف الخط الخارج

من مركز العالم الى منطقة المايل مارا بمركز التدوير ومنها

وسطه وهو ايضا قوس من منطقة المايل على التوالي بين اول الحمل و

طرف الخط المذكور وبينهما خاصته الوسطى وهي قوس من منطقة

التدوير على التوالي بين الذروة الوسطى ومركز جرمه فان

كان تلك القوس منها بين الذروة المدبرة ومركز جرمه فهي خاصة

المشرية ومنها التعديل وهو قوس من منطقة الممثل على التوالي

بين اول الحمل ونقطة تقاطع دائرة عرض القمر والممثل فان

كان تلك القوس منه على التوالي بين نقطة الراس وبين نقطة

التقاطع المذكورة فهي حصة عرضه

المبحث الرابع

في بعض الاوضاع الحادثة من حركة الفلك الاعلى وحركة الفلك الثامن

اعني الاولين اعلم انه اذا حرك فلك فلكا فيحركه بجميع اجزائه

مثل بحركة التشفيف وله مع ذلك حركة خاصة به اما الى جهة حركتها

واما الى خلافها فلتصور في الفلك التاسع المحرك الثامن مثله

وليعلم ان الفلك الثامن اذا تحرك بحركته الخاصة به يختلف

اوضاع الكواكب والنقاط المفروضة عليه بالنسبة الى معدل

النهار ومطلعيه وكذا المدارات اليومية لكل كوكب بل يختلف من

مدار الى مدار الهواء اصعد وكذا ارتفاعاتها وابعادها

يزيد وينقص فيختلف بعضها مرور بسمت الراس ويصير بعضها

ابدى الظهور او الخفاء بعد ان لم يكن ثم ذا طلوع وغروب لكن
لا يختلف بالنسبة الى منطقته وقطبيه ولا يتبدل لنسبة بعضها الى
بعض ولا تفارق من مداراتها العرضية ابدا واذا عرفت هذا
فاعلم ان الكواكب الثابتة التي تحمل الفلك الثامن وهي
المتحركة بحركة هذا الفلك اعني الحركة الثانية لا تخلو اما ان تكون على
نفس منطقته عديم العرض او ذي عرض وعلى التقدير الثاني فاما ان
يكون عرضه اقل من الميل الكلي او مساويا له او زايدا عليه او مساويا
لتمام الميل الكلي او اكثر وما اقل من الربع فهذه ستة اقسام ولكل منها حكم
اما الاول فهو اعني الكوكب يقطع معدل النهار في دورته بالحركة
الثانية مرتين وينتصف مداره المعدل ويكث في احد نصفيه
مثل مكثه في نصفه الآخر شماليا كان او جنوبيا واما الثاني
فهو ايضا يقطع المعدل في دورته مرتين لكن قطعتا مداره
الشمالية والجنوبية عن منطقة البروج متخالفتان واعظمها
هو الذي في جهة عرض ذلك الكوكب واول السرطان والجدي
يوازي منتصفي القطعتين فان كان عرضه الكوكب شماليا فمنتصف
القطعة العظمى من مدار الكوكب السرطان وان كان جنوبيا
فالجدي واما الثالث فهو لا يقطع معدل النهار لكن يماسه
في دورته

في دورته مرة على انقطاعي الانقلاب من معدل النهار التي في جهة
عرض الكوكب فان كان عرضه شماليا فيماس نظيرة راس الجدي
وان كان جنوبيا فنظيرة راس السرطان واما الرابع فهو
لا يقطع المعدل ولا يماسه بل يغرب منه في راس المنقلب الذي في
خلاف جهة عرضه وحينئذ يكون في اعظم مداراته اليومية وبعده
عنه في المنقلب الآخر وحينئذ يكون في اصغر مداراته اليومية و
اما الخامس فهو يصل في دورته مرة الى قطب المعدل عند
وصوله في مداره الى راس المنقلب الذي في جهة عرضه وحينئذ
لا يكون له مدار يومي واما السادس فهو اذا بلغ بتغاير
راس المنقلب الذي في جهة عرض الكوكب يدي الحركة الاولى
في مداريها اليومي والثانية في مداريها العرضي في ربعين منها مماسين
من خارج عند نقطة مشتركة وكذا في ربعين آخرين متقابلين لهما
كانتهما الى جهة واحدة وليس كذلك وفي الى ارباع الآخر لا يرى
مثله بل الى جهتين مختلفين ولتسهيل تصورين ينبغي ايراد مثال
فنفرض كوكبا عرضه سبعين درجة ومداره اليومي تحت منطقة
المعدل الاحمى ومداره العرضي ومنطقة البروج كدائرة
ولتكن جهة حركة كل منهما على ترتيب الحروف وهي مكتوبة

وعقد او الملك في كل نصف
اثنا عشر الفا وثمانية
سنة

هو الذي يكون عرضه شماليا

على أوساط الأرباع فحينئذ يظهر على الناظر رؤية حركة الكوكب
في ربع آ من مداره اليومي وربع د آ من مداره الوحي
انها لجهة واحدة وكذا في ربع ح د من اليومي و ح آ من
العرضي وان كانت جهة احديهما غير جهة الاخرى وفي كل
من الربعين الباقيين الى جهتين مختلفتين لكن في ربعي
د آ ح آ يريانهما متواجهتين وفي ربعي
ح ج ج آ متقارنتين وصورته
المرسومة على السطح يكون هكذا
ولما لم يجدوا على نفس قطب البروج
كوكبا لم يتعرضوا للاحكام لكوكب
عرضه تسعون وايضا مما لزم
من حركتها فيه ما قيل ان الميل الكلي
الذي وجده القدماء اكثر مما وجده المتأخرون
فيما الضرورة ان لم يكن هذا بسبب اختلاف الآت الارصاد و
اختلالها فهو يكون بسبب حركة احدى المنطقتين ولما امتنع صدور
هذه الحركة عن المعدل فهي من منطقة البروج ثم هذه الحركة
ان تحركت عرضا فهي تحتمل ثمانية اوضاع لا غير وهي اما ان تدور

دورة تامة أولا بل يتحرك الى غاية تم يعود منها وتلك الغاية
لا يخلو اما ان تكون قبل الانطباق الاول او الثاني او عندهما
او بعدهما وبكل وضع منها لوازم فليستخرجها المتأمل الفطن وفيه
ما فيه على اختلاف وقع في قدر الحركة الثانية بانها تقطع درجة
اما في مائة سنة او ستة وستين او سبعين بعد ما سمع بعض
من زعم قوم ان الفلك اثبات لا بسبب انتقال اول الجرم عن موضعه
الى التوالي واذبار امنه لاختلافه فظن ان الاختلاف المذكور
في السرعة والبطء يحصل بسببهما وهذان الاختلافان ان كانا كما
ظنوا وجب عليهم اثبات محركين آخرين لان بعضهم الكفي يحرك
واحدا لها يتوسط بين فلك البروج والمعدل بحيث يكون
بين قطبيه وقطب البروج من المبادرة ثلاثة اقطاب اربع درجات
ويحرك منطقة البروج على وجه يرتسم كل نقطة منها دائرة صغيرة
متوهمة بنصف محيطها ثمانية درجات فيرتسم من قطبها ايضا
صغيرة مثلها من الحركة في احد نصفيه يقع الاقبال وفي الآخر
الادبار ومن منتصف احديهما الى المنتصف الآخر استقاص الميل
وفي النصف الباقي ازدياده واما الكواكب الثابتة فهي على
الرأي الاصح مذكورة في جوزم الفلك الثامن مختلفة القدر كثيرة

العدد بحيث لا يكون محصورة وما زاد منها الا الف والف ومائتان وعشرون
عند الاكثرين حصلوا مواضعها من فلك البروج في الطول والعرض
ورتبوا اقدارها في ستة مراتب على تفاصيل سدس سدس من جملة

ما وقع في العظم الاول وتسمى العدد الاول ايضا يكون قطرها
ستة امثال ما في العظم السادس اولاها اعظمها وفي كل قدر ثلث
مراتب ايضا الكبرى اوسط واصغر وما دون السادس من
المرصودة لم يثبتوه في مراتب الاقدار وتوهموا التغير تقاصرا
عن عليها او تبرعا وتلك الصور ثمانيا واربعين منها احدى وعشرون
في الشمال واثنا عشر على المنطقة وهي البروج الاثنا عشر وخمس
عشرة في الجنوب واسماؤها مع شهرة بعضها وصورها مكتوبة
مثبتة في كتب الفن فليرجع اليها من اراد التفصيل واما المجرة
اعني الدائرة اللبنية فالاصح انها تخيل البنا من كواكب صغار دقاق
متشابكة جدا حتى صارت من التكاثف والصغر كانها لطخات سحابية
وانما شبهت باللبن وسميت بالمجرة لانه يشبه لون اللبن وكاثر
مجرى شيء يشبهه وانما منازل القمر فاعلم ان الفلك قسم
بثمانية وعشرين قسما ليكون مطابقا لعدد ايام دور القمر
ليسمى كل منها منزلا وهي الساحة التي ينزلها القمر ويقطعها

في اليوم بليلته وعلامة كل منزل لكوكب من الكواكب الثابتة قريب
من منطقة البروج واسماؤها ايضا مشهورة

المبحث الخامس في فلك الشمس وما يلزمه من الحركات وغيرها المحاذي للاقسام

ان يكون لحركات الشمس الصادرة المشاهدة منها اصلان فنبتدأ
جامعا ابسط منهما الفلك الكلي للشمس جسم كري كما مر في تعريف الفلك
شامل للارض محدد به تماس لمقعر فلك المتبع ومقعره لمحدب
فلك الزهرة ويسمى الفلك الممثل بفلك البروج للكونه بالمنطقة
والقطبين والمركز موافقا له وكذا في ممثلات الكواكب بمركز
الكل اي مركز العالم ثم نفرض فيما بين سطحيه المتوازيين
اعني في تخنه لا في جوفه جزما كريا اي فلكا آخر مسمى بالخارج
المركز شامل للارض مركزه خارج عن مركز العالم فيكون
ماثلا بكله الا جانب من الممثل بحيث يماس محدب هذا الفلك
محدب الفلك الكلي على نقطة مشتركة بينهما تسمى اوجا ومقعر
هذا مقعر ذاك على نقطة مشتركة بينهما ايضا وتسمى حضيضا
فبسبب انفصال هذا الفلك الخارج المركز عن تخن الممثل يبقى بين
تخنيه كرتان مختلفتي التخن بالرقة والغلظ احديهما
حاوية عليه والاخرى محوية فيه رقة الحاوية من جانب

شبكة الألوكة
www.alukah.net

للاوج وغلظها من جانب الحضيض ورقة المحوية وغلظها بخلاف ذلك.

ليستقم كل واحد منهما فله قطبان غير قطبي الممثل بهما طرفا محور موازٍ للمحور، والشمس جرم كرى مصمت مركوز في تخن الخارج المركز مغروق فيه بحيث يماس سطحها سطحيه فقطع هاشر

يكون متساويا التخن، ويعد مركز هكل عن قطبيه بكون بعدا واحدا وهذه صورة افلاك الشمس بناء على الأصل الاول و

الثاني اما حركات افلاكها فالاولى الممثل يتحرك على التوالي حول مركز العالم على منطقة وقطبين مسايرة لمنطقة فلك البروج وقطبيه حركة مساوية لحركتها كان هذا يتحرك بها وبهذه الحركة يحرك الخارج المركز بالعرض ويسمى حركة الاوج والثانية حركة الخارج المركز الى التوالي المدينة لجرم الشمس حول مركزه على منطقة ثابتة في سطح ممثله الذي هو في سطح منطقة البروج وقطبين غير قطبيها وهو موازٍ للمحور فلك البروج في اليوم بليلته تسعة وخمسون دقيقة وثماني ثوان

وعشرون ثالثة من محيطه وتسمى حركة وسط الشمس فظهر ان التمى للاوج منطقة البروج فلا عرض لها البتة ومكنها في النصف الاوج الذي من مكنها في نصفه الآخر لميلان الخارج في تخنه فتختلف قسي حركتها في الازمنة المتساوية وابعادها عن مركز العالم ايضا ويلزم لها اختلاف واحد وقد مر في بيان القسي وهو بقدر زاوية تحدث عند مركز ما بين خروج خطين عن مركز فلكيها اليه وغاية في العظم عند البعد الى وسط بقدر ما بين المركزين فتختلف حركتها المرئية حركتها الوسطى وتتحدان في الاوج والحضيض

الاصل الثاني

تعرض للشمس فلكا موافق المركز حاملا للتدوير مركوز في تخنه لما عرفت كالشمس في تخن الخارج المركز بشرط ان يكون نسبة نصف قطر الحامل الى نصف قطر التدوير في هذا الاصل كنسبة نصف قطر الخارج المركز الى ما بين المركزين في الاصل الاول ونجعل حركة الحامل شبيهة بحركة الخارج المركز قدرا وجهة بحيث يتم دورة احدهما مع دورة الآخر وحركة التدوير ايضا شبيهة بهما على وجه يكون في القطعة البعدة لا خلافا في جهة حركة الحامل وفي العربية الى جهتها وحينئذ يتحد مركز التدوير بالحامل والكوكب بالتدوير فيدرك

حركة الكوكب في البعدة بمقدار فضل حركة الحامل على حركة
التدوير وفي القربة بمقدار مجموعهما فالحركة المدركة ههنا
تكون مثل الحركة المدركة في الاصل الاول من جنس اللواحم بقيها
من غير تفاوت اصلا وان جعلنا حركة قطعتي التدوير بخلافهما
قلنا لجاز لكن زمان سرعة الكوكب في هذا الاصل يكون
اطول من زمان البطوء وهناك يكون اقصر ويرتسم مركز التدوير
بالحركة المركبة مدارا تشبيها بالخارج المركز
مركزه خارج عن مركز العالم وهذه
صورة فلك الشمس بناء على الاصل الثاني
مقتصرا على الدوائر

المبحث السادس

في افلاك القمر وما
يتبعها الفلك الكلي للقمر يشتمل على اربعة افلاك
ثلثة منها شاملة للارض الاول ويسمى الفلك المثل والحوذر
ايضا محدد بماس لمقعر فلك عطارد ومتجره لمحدب الفلك
المايل من افلاكه ومركزه مركز العالم وحالة بالنسبة الى ما في
ضمنه من افلاك القمر كنسبة حال المحدد الى افلاك الكواكب
ويتحرك بما في ضمنه الى خلاف التوالي كل يوم بليلة ثلث دقايق
وكرا

وكرا فيتسفل بها الحوذر هو فلك الحركة منسوبة اليه لظهورها
فيه الثاني وهو المسمى بالفلك المايل لميل منطقته الثابت
من منطقة المثل محدد به ماس لمقعر المثل ومتجره وبه ينتهي
الافلاك المحدبة كرة النار من العناصر ويسمى لتقاطع
منطقتي هذين الفلكين العقدتين والحوذرين والراس
والذنب فيلزم تباعد قطبيه عن قطبي المثل على التبادل
وحركته الى خلاف التوالي ايضا حول مركز العالم كل يوم احدى
عشرة درجة وتسع دقايق تقريبا وتحرك معه الحامل و
تسمى حركة الاوج اذ بها ينتقل البعد الابعد والاقرب فيرتسم
من مركزه ومدار حول مركز المايل يسمى الفلك الحامل لمركز
الحامل الثالث وهو المسمى بالفلك الخارج المركز والحامل
ايضا منفصل من تخن المايل انفصال خارج مركز الشمس عن تخن
فلكها الكلي بعينه بلا تفاوت فيلزم فيه للقمر ايضا اوج وحضيض
ومنطقته في سطح المايل دايما وحركته الى التوالي حول
مركزه كل يوم يكون اربعا وعشرين درجة وثلثا وعشرين
دقيقة تقريبا وبها تتحرك مركز التدوير لانه لجزء منه ضمني
بحركة مركز التدوير وحركة العدض وهي بعينها حركة الطو

اذا انبعث الى درجات منطقة البروج وقطبا ها طرفا محور
موازٍ لمحور المايل ثم يصير القمر ذا عرض في جهتي الممثل الى
غاية معينة شمالي من الراس الى الذنب جنوبي من الذنب
الى الراس صاعد من الغاية الجنوبية الى الغاية الشمالية هابط
من الشمالية الى الجنوبية الراس وهو التدوير في نحن الحامل
والقمر جسم كري مصمت مركوز في جزء منه بحيث يماس سطح
التدوير على نقطته الملازمة لسطح منطقة الحامل على نقطة مشتركة
بينهما وحركته في نحن حامله اعني في مكانه الى خلاف التوالي
لكن في نصفه الاعلى على محور وقطبين ثوابت كل يوم ثلث عشرة درجة
واربع دقايق تقديبا وتسمى حركته الخاصة وحركة الاختلاف
ايضا وبها تحرك جرم القمر ومبدأها الذروة الوسطى
للتدوير وهذه صورة افلاك القمر
مجسمة

ثم اعلم انه يلزم بسبب حركة افلاكه للقمر اختلافات وعوارض الاول
توسط الشمس بين اوج القمر ومركز تدويره دايما لانا اذا فرضنا
ان مركز تدوير القمر قارن في اوجه مركز الشمس عند
نقطة ثابتة من فلك البروج ثم تحرك كل منهما بوسط سيره و
فارق عن تلك النقطة الى جهة التوالي مساويين مركز التدوير بحركة
الحامل الى التوالي مقدار كد كب ك واما الاوج فبحركة
المايل والممثل الى خلاف التوالي مقدار ب ا ح ك فيما
يبدو ان الحامل ونقصان عن مقدار حركته بقدر مجموع
حركتيهما فيبقى وسط القمر في اليوم بليلته نحو ا ه ولما
تحركت الشمس ايضا بوسطها في اليوم بليلته عن النقطة
الثابتة في جهة حركة مركز التدوير مقدار ه ط ح ك
فلتقرب الى المركز ضرورة ولتبعد عن الاوج فينقص قدر
وسطها عن مقدار وسط القمر وتزاد ايضا على مقدار
حركة المايل والممثل ليبقى من الاول س ا كو م بعد
المركز عن الشمس وليحصل من الثاني هذا القدر بعينه
تبعد الاوج عنها ايضا فيتوسط الشمس دايما بين مركز
التدوير والاوج بعد مفارقتهما النقطة الثابتة الى ان تقابل

الاوج المركز عند تربيعهما الشمس ويتقارنان في استقبالها
ويتقابلان في التربيع الثاني مرة اخرى ويجتمعان عند الاجتماع ثانيا
فنقول ان بلغ المركز الاوج في دورة واحدة مرتين وكذا بلغ
الحضيض مرتين وتسمى حركة المركز البعد المضعف لانه
اذا ضوعف البعد بين المركز والشمس كان ذلك مساويا
للبعد بينه وبين الاوج ثم اعلم انه لو لم يكن من حركة
وسط الشمس الا التوالي لرسم مركز التدوير في وصوله
الى الاوج والحضيض في الدورة مرتين مثل ا ا اهليلجيا
بيضيا هكذا لكن بسبب حركتها تتقاطع
ضلع ه د منه ضلع ا ه
على نقطة ح فلا يبقى المدار اهليلجيا
تاما بل منكسر الطرف في جهة آ بعذر
موتر وسط الشمس هكذا
الثاني ويسمى التعديل المفرد والاول
ايضا وهو الذي يقع من جمع حركة القمر
على محيط تدويره في الاوج وهو زاوية
حادثة على مركز العالم من خروج خطين احدهما الى مركز
الدور

التدوير والآخر الى مركز جرم القمر وتسمى اذا كان القمر
في ذروة تدويره او حضيضه المدتين وغايتها في البعدين
الاوسطين مثل التدوير يكون بقدر نصف قطره وهي
خمسة اجزاء وربع ناقص عن الوسط ما دام القمر هابطا
زائدا ما دام صاعدا الثالث وهو اختلاف البعد الاقرب
فقط وقد يسمى التعديل الثاني ايضا وهو ما يقع بسبب زيادة
التعديل المفرد ونقصانه من عظم نصف قطر التدوير و
صغره بحسب قربه وبعده عن مركز العالم وذلك لانه
اذا انزل مركز القمر عن الذروة الى بعده الاوسط التدويري
ومركز التدوير عن الاوج صار بعد الخطين المارين
بمركزي القمر والتدوير كل ساعة ازيد مما كان قبله فمركز
التدوير يكون اقرب الى الحضيض فنصف قطره حينئذ
يكون ازيد وغايته عند الحضيض درجتان وثلثا
درجة اعني اذا كان غاية هذا الاختلاف زائدا على ذاك
بهذا القدر ففي نصف هذا يكون زائدا على نصف ذاك بجزء
وثلث جزء وقس عليه اذا صعد المركزان المذكوران وكان
الاختلاف ناقصا الرابع وهو ما يقع بسبب نقطة سماه

بنقطة المحاذاة في القمر على الخط المار ببركز العالم والحامل
بعدها عن بركز العالم من جهة الحضيض مثل بعد بركز الحامل
عنه من جهة الاوج وسبب هذا الاختلاف ان الخط المار بحضيض
التدوير وذروته الوسطى وهي مبدأ حركته الخاصة الذي هو
في الاوج والحضيض منطبق على الخط المار بالمراكز لا يبقى على حاله
مركز الخارج ولا على حاله مركز العالم بل على حاله نقطة المحاذاة
ابدا بحيث لو اخرج من نقطة المحاذاة خط مستقيم الى القطر
المذكور لا تصل به على الاستقامة وبسبب تلك المحاذاة يخالف
موضع الذروة الوسطى والذروة المدرية وكذا الحضيضيها وغايته
هذا الاختلاف اعني بين الذروتين ثلثة عشر جزءا وكسرا
وينعدم عند كون مركز التدوير في الاوج والحضيض ويزاد
على الخاصة ما دام المركز هابطا وينقص منها ما دام صاعدا
ويسمى لتعديل الحركة الخاصة الخامس وهو اختلاف
يقع بسبب تفاوت بين بعد موضعيه عن منطقتي الممثل
والمايل عن العقدتين وذلك لان حركة تعويله انما هي
من منطقة المايل فاذا مددنا فوسا من دايرة ممر بقطبي
المايل وبمركز القمر قاطعة للممثل فنقطة التقاطع هي موضع
القمر

الذي عندها ينعدم الاختلاف
الاول بالقياس الى
مركز العالم

لكون الذروة الوسطى اقرب الى الاوج
من الذروة المدرية وكون القمر في الذروة على
خلاف الحوالي

القمر بالقياس الى المايل واذا فرضنا القوس من دايرة
العرض فنقطة التقاطع منه هي موضعه الحقيقي بالقياس الى
الممثل فالتفاوت بين الموضعين من الممثل اعني تعديل
النقل يسمى الاختلاف المذكور ويعتبر ذلك اذا اريد تحويل
احدهما الى الآخر ويسمى بنقل القمر من المايل الى البروج
وغايته عند نصف الربع من احدى العقدتين وينعدم عند
كون القمر في احدى النقط الاربع العقدتين او منتصفاتها
بينها في منتهى الشمال والجنوب من موضع القمر حينئذ بالقياس
الى الممثل والمايل نقطة واحدة وله اختلاف المنظر ايضا
وقد مر اليه اشارة واما المحاق وهي حالة تعرض
للقمر عند اجتماعه مع الشمس بسببها لا يظهر للابصار
واما المحو فهو اختلاف آخر آخر سطحه في قبول النور
اما ذكر الخسوف فستقف على الكل منها بعد
ان شاء الله ومن اراد ان يتصور من صورة فلك القمر
على الدايرة من غير تجسيم فليرسم منطقتي الممثل
والمايل متقاطعتين ومنطقة الحامل مماسا للمايل عند
الاوج ومنطقة التدوير بحيث يكون مركزها على منطقة الحامل

فهو الاختلاف في حقيقته والا فالاختلاف الموجود احد امور مختلفة معدودة في الاوسط غير قابل للانالة بها لتساوي اما الاختلاف في موضعي

هكذا وكذا القياس
إن أراد في أفلاك
الكواكب كلها على
الدوائر التي رسمنا
لكل فلك دائرة وبعد

ذلك فاعلم أن الحامل إذا تحرك

وتحرك التدوير حركة بسيطة متشابهة وجب تساوي أبعاد
مركز التدوير في جميع الجهات عن مركز الحامل وإلا لم يكن
المركز مركزا ولا المحيط محيطه وتساوي الزوايا حوله أيضا
في الأزمنة المتساوية وإلا لم تكن الحركة متشابهة وكون القطر
المار بالذروة والحضيض في التدوير مستقيما لمركز الحامل أيضا
لأنه لو كان محاذيا له في وضع فيجب أن يكون محاذيا له في جميع
الأوضاع وإلا لم يكن محاذيا له لامتناع زواله عن وضعه بحركة
التدوير وإلا لم يصلح طرفه بأن يكون مبدأ لحركة التدوير
لكنه ليس الأمر كذلك إذ تساوي أبعاد مركز تدوير
عن مركز الخارج وتساوي الزوايا عند مركز العالم
محاذاة القطر لنقطة المحاذاة فظهر أن هذا الاختلاف

لزم

لزم من تركب في الحركة ولما كان بيان ما حل منه موقوفا
على مقدمات وفيها إطناب أعرضت عن ذكره في أفلاك القمر
والكواكب مخافة التطويل

المبحث السابع

في أفلاك الكواكب العلوية والزهرة وما يتعلق بها ينبغي أن
تتصور لكل واحد من زحل والمشتري والمريخ والزهرة
فلكا كليا مسمى بالممثل يتضمن ثلثة أفلاك اثنان منها شاملان
للأرض أحدهما مختص باسم الممثل والآخر بالخارج المركز
لما عرفت وسطح منطقته لا يكون في سطح منطقة الممثل و
كيفية تصور أحدهما بالنسبة إلى الآخر وانفصاله عنه كما تصورت
وتفصلت في فلك الشمس أعني الأصل الأول بعينه بلا فرق البتة
حتى يصير الممثل بعد الانفصال ثلثة أجزاء متماسين حاويا و
محويا وخارج مركز ويحصل جميع اللوازم والعوارض أيضا
فاعلم منه عني أن الفلك الثالث منها وهو التدوير مركوز
في سمك الحامل قائما مقام جرم الشمس في سمك فلكها الخارج
المركز وقد عرفت كيفية ركزه فيه وإذا فرض محدار مركز
التدوير قاطعا للعالم تحدث دائرة عظيمة تسمى الفلك المائل
لذلك الكوكب وتقطع الممثل على نقطتين بهما الرأس والذنب

وهذا الميل ثابت في الجهتين الافلاك العلوية غير ثابت في البروج
وسيجيء في المبحث التاسع ذكره والكوكب وهو جسم كرى مصمت
مركوز في التدوير على الرسم المذكور غير أن مناطق بعاد نير
المتحيرة لا تثبت في سطوح افلاكها المايلة بل تثبت مراكزها فيها
فقط وستعرفه ولما كان لكل فلك منها مجدبا ومقعرا فمجدب فلك
زحل ماس لمقعر الفلك الثامن ومقعره لمجدب فلك المشترى
ومقعره لمجدب فلك المريخ ومقعره لمجدب فلك الشمس ومجدب
فلك الزهرة ماس لمقعر فلك الشمس وقد مر ذكرها ومقعره
لمجدب فلك عطارد وقد عرفت كيفية تماس السطوح الباقية

وهذه صور افلاكها المجتمعة
ولكل واحد من
هذه الافلاك حركة
اما الممثل
فهو يتحرك بما في
ضمنه على التوالى
بالحركة الثانية البسيطة
للفلك الثامن على قطبين
ماشين

ماشيين لقطبيه حول مركز العالم وقد عرفته وهى تظهر
في العقدتين والبعدين الاقرب والابعد لانتقالها بهما وينتقل
بتمامه مركز الحامل ايضا ولذلك تنسب الى الاوج والعقدة و
اما الحامل فهو يتحرك على التوالى ايضا حول مركز
الخارج عن مركز العالم على قطبين ومنطقة ومحور غير
قطبى الممثل ومنطقته ومحوره وان لم يتشابها عندهما
وهى كل يوم بليلته لرجل دقيقتان وللمشترى خمس دقايق
وللمريخ احدى وثلثون دقيقة وللزهرة مثل وسط الشمس
وقد عرفته وهذه الحركة تظهر في مركز التدوير لانتقاله
بها اذ هو كالجزء منه فتسمى حركة المركز وحركة العرض ايضا
وتتشابه عند نقطة خارجة عن مركز العالم والحامل بمسافة
مركز معدل المسير وهى على القطب الماس بالمراكز مايلى الاوج
بعدها عن مركز الحامل مساو لبعده عن مركز العالم فيتبين
ان بعدها عن مركز العالم نصف بعدها عن مركز الحامل و
ذلك لرجل ستة اجزاء ونصف وثلث وللمشترى خمسة اجزاء
ونصف وللمريخ اثنا عشر جزءا وللزهرة جزآن وخمس
دقايق فلك النقطة هى مركز دايرة قطرها يكون بقدر قطر

شبكة الألوكة
www.alukah.net

قطر منطقة الحامل يحدّ بها طرف خط خارج منها مسمّى بالخط
المدير ماتمر كزا التدوير وذروته في دورة بحيث ينطبق عليه
قطر التدوير المارّ بالذروة والحضيض المحاذيين للراصد وهذه
الدائرة الحادثة هي المسماة بفلك معدّل المسير المساوي متحرك
منه في الازمنة المتساوية بالنسبة الى مركزه اعني النقطة
المذكورة ومجموع الحركتين المذكورتين هو وسط الكوكب و
اما التدوير فهو متحرك في مكانه على نفسه الى التوالي في
نصفه الاعلى على محور وقطبين ثابتة ويحرك جرم الكوكب
في اعالي التداوير الى التوالي اما في العلوية فبقدر فضل
حركة وسط الشمس على وسط كل منها وذلك في اليوم بليلة
لزحل سبع وخمسون دقيقة وللمشتري اربع وخمسون دقيقة و
للمريخ ثمانية وعشرون دقيقة ومن ثم لزم ان يكون ابعاد
مراكز جرم العلوية عن مراكز تداويرها بقدر ابعاد وسط
وسط الشمس عن مراكز التداوير في افلاكها الشاملة للارض فمتى
تزلك العلوية الحضيض التدوير وهي في وسط ايام رجوعاتها
تقابلها وسط الشمس ومتى صعدت الى الذروة تعود الى مقارنة
الشمس وهي محترقة في وسط ايام استقامتها واما في الرصد
فبقدر سبع

فلكات الحركة المستوية على صحيط فلك الدائرة في اليوم

ابعاد خط خارج من مراكز هذه الافلاك سيرها الى تداويرها

اوج فضل حركة وسط الشمس على وسط كل منها

سبع وثلثين دقيقة وسبب هذه الحركات المساة بحركة الاختلاف
والحركة الخاصة للكوكب الذروة الوسطى وقد مرّ ذكره ثم
اعلم ان مركز تدوير الزهرة دايما مقارن لمركز الشمس
فلهذا لما اديرت الزهرة على محيط تدويرها دورة تحترق
سرتين مرة في ذروة التدوير وهي منتصف قوس استقامتها
من المحيط ومرة اخرى في حضيضه في منتصف قوس رجوعها
منه ايضا ولا يتبعد عن الشمس في جانبيها الا بقدر نصف قطر
تدويرها ومقدار نصف قطر تدوير كل واحد من الكواكب
الاربعة على ما ادرك بالترصد هكذا لزحل ستة اجزاء ونصف
للمشتري احد عشر جزءا ونصف للمريخ تسعة وثلثون جزءا ونصف
للزهرة ثلثة واربعون جزءا وسدس هذا بحسب ما يكون نصف
قطر الحامل ستين فظهر منه ان تدوير المريخ والزهرة
اعظم جدا من ساير التدويرات فلهذا قيل اذا احترق
المريخ في ذروة تدويره كان البعد بينه وبين الشمس اعظم
بكثير مما بينهما وهو في مقابلة الشمس في حضيض التدوير وذلك
لان ما بينهما في الوضع الاول قطر كرة تدويره مع ما يتفق
من مماسات فلكيهما وفي الوضع الثاني قطر كرة ممثل الشمس

شبكة الألوكة
www.alukah.net

مع ما يتفق من المتممات والاول زائد بكثير على الثاني وهو من المسائل
المستغربة وستطلع عليه في مساحة الاجرام والابعاد وأسباب
الاختلافات العارضة لهذه الكواكب الاربعة منها الاختلاف الاول
الذي يقع بسبب حركة الكوكب عن بعده الاوسط على محيط التدوير
وحدوث زاوية على مركز العالم من خروج خطين عنه احدهما الى
مركز التدوير والآخر الى مركز جرم الكوكب وعليه يحسب
ما يقتضيه نصف قطر التدوير في البعد الاوسط من التدوير
ويزاد على موضع مركز التدوير في النصف الهابط منه وينقص
في الصاعد بخلاف ما في القمر ويسمونه بالتعديل الثاني والمفرد
ومنها الاختلاف الواقع من جهة نصف قطر فلك التدوير
في الرؤية لاختلاف بعده وقربه من مركز العالم بسبب حركة
الحامل فنراه زايدا في البعد الاقرب على ما كان في البعد
الاوسط وناقصا عنه في الابعد وهذا الاختلاف يلحق الاختلاف
الاول ويسمى اختلاف البعد الابعد والاقرب معا ومنها
الاختلاف الواقع بحسب تشابه حركة مركز التدوير حول
نقطة غير مركز العالم وبحسب اختلاف الذروتين وسوية
حادثة على مركز التدوير من خروج خطين منه احدهما الخط

لان سيره خاصته يخالف خاصته في الجهة

هذا الاختلاف الرابع مندرج في الثالث

هذا كتشابه حركة المتمول مركزها الخارج

المدير والآخر الى مركز المسير والآخر الى مركز العالم وهذا الاختلاف
يزاد على الخاصة وينقص من المركز ما دام الكوكب هابطا وبالعكس
ما دام صاعدا ويسمونه تعديل المركز والخاصة وهذه صورة
افلاكها ايضا منتصرا على الدوائر فلكك
شناخطسة المثل والمايل والحامل
ومعدل المسير والتدوير
وقرن تنير الثاقب
القمر من بعد على ما
مر من التي التي كانت
مخصوصة بالقمر هذا ان اخذ



من ميل كل من هذه الكواكب
اما ان اخذت من محيط معدلات المسير فلكان في قسي الوسط والاوج والمركز رسم آخر
كما اخذت في القمر من فلك مايله

المبحث الثامن في افلاك عطارد وحركاتها ومايليتها اعلم ان

لعطارد فلكا كليا سمي بالممثل محدد به مائل لمعدل فلك الزهرة
ومتجدده المحدد بمثل فلك القمر وقد عرفتها وهو يتضمن اربعة
افلاك الاول الممثل المذكور وهو يتحدك بحركة الثوابت
بما في ضمنه على التوالي حول مركز العالم وتظهر حركته في اوج الفلك

المدير وحضيضه والعقدتين ومركز المدير والحامل وتسمى
حركة الاوج الممثل الثانى الفلك المدير الذى مركزه خارج عن
مركز العالم وهو فى تخن الممثل لا فى جوفه بالصفة التى عرفتها
فى فلك الشمس وغيره فيصير الممثل بسبب انفصاله عنه ثلثة اجزاء
اثنان منها المتمان من الممثل والثالث هذا الفلك المدير
المتوازى السطحين المحدب والمقعر المساوى التخن الخارج
المركز المايل لممثل طبقته عن منطقة الممثل الباطنة وهى
عظيمة منصفة للعالم فى موضعين يسميان الراس والذنب لعطارد
وللعظيمة الفلك المايل له وهو غير ثابت ويسمى ذكرهما
والنقطة التى هى عند غاية الميل المذكور اوج المدير والممثل
الثالث الخارج المركز ايضا الذى يطلق عليه الحامل لما عرفت
وهو فى تخن المدير لا فى جوفه ايضا على الرسم المذكور كما مر غير
مرة بحيث يقع ههنا بعد افراغه عنه ما وقع ثم بلا تفاوت اصلا
فبسبب انفصال الحامل عن تخنه يصير الفلك المدير ايضا ثلثة
اجزاء اثنان متمان منه والثالث هو الفلك الحامل المذكور
فيلزم لعطارد اوج آخر وهو اوج الحامل ومنطقته دايما
فى سطح منطقة المدير اذا ادركت كيفية تفصيل هذه الافلاك
بعضها

بعضها عن بعض علمت ان لفلك عطارد بسبب افراز فلكية الخارج
المركز اربع متمات وحامل واوجان احدهما كالجزء من ممثله
ويسمى اوج الممثل والآخر كالجزء من مديره ويسمى الاوج
المديرى وحضيضان كذلك الرابع فلك التدوير وهو
معلق فى تخن الحامل والكوكب الذى المصمت مركوز فى التدوير
كل بالشرط المذكور والكوكب يدور بحركته على منطقة تدويره
هذه صورة افلاك عطارد

مجسمة ولكل من هذه
الافلاك حركة اما
حركة الممثل
فقد عرفته
واما
حركة المدير فهى
الى خلاف التوالى
بما فى تخنه حول مركزه
الخارج بقدر الحركة الوسطى
لمركز الشمس وهو فضل حركة الشمس على حركة اوجها وتلك الحركة

يرتسم مركز الحامل مدارًا حول مركز المدير مسمى بالفلك الحامل لمركز
الفلك الحامل وتحس هي في أوج الحامل وحضيضه وتسمى حركة المدير
والأوج المدير أيضا إذ فيه الاوج الثاني لعطارد وأما
حركة الحامل فهي الى التوالي مثل ضعف حركة مركز الشمس
وتحس في مركز تدوير عطارد ولهذا تسمى حركة المركز و
حركة العرض ايضا وهذه الحركة تشوى وتشابه حول
نقطة غير مركز فلكها على منتصف ما بين مركز العالم ومركز
المدير أعني على بعد ثلثة اجزاء من كل منهما وهي مركز فلك المعدل
المسير وقد مر ذكره وأما حركة التدوير على نفسه في
مكانه فهي الى التوالي ايضا لكن في نصفه الاعلى كل يوم بليلتيه
ثلثة اجزاء وست دقايق وينتقل بها الكوكب على وجه عرفته
وهي حركة الاختلاف والحركة الخاصة ومركز هذا التدوير
أيضا مقارن دايما لمركز الشمس كما عرفت من تدوير القمر
بلوازمه ونصف قطره اثنان وعشرون جزاء ونصف
جزء فلا يبعد عطارد من الشمس في جهتيها الى هذا القدر و
أما الاختلافات العارضة للكوكب عطارد فمنها توسط
الاوج الممثلي للتدويرين بين مركز تدوير عطارد وبين

الاوج المدبري للحامل ابدا وذلك لان حركة مركز تدوير
عطارد بالحامل الى التوالي ضعف حركة أوج المدبري بالمدبر الى
خلافه فالمدبر يرد الحامل بقدر حركته فيبقى فضل حركة
مركز التدوير الى جهة عن الاوج الممثلي مثل حركة الاوج
المدبري الى الجهة الاخرى وكل منهما مثل حركة مركز الشمس
فالاوج الممثلي متوسط بينهما ابدا مثلا اذا اجتماعنده في درجة
من برج فكان المراكز الاربعة واقعة على الخط المار
بالاوج والحضيض مترتبا على أبعاد متساوية ثم تحركا عنه
كل الى جهته فاذا بلغا الاتربيع تلك الدرجة من الجانبين لقي
المركز الحضيض المدبري واذا انتهيا بعد قطع كل منهما
ربعا آخر الى مقابلتها تقارنا مرة أخرى والمركز واقع في
الحضيض الممثلي وحينئذ يلاقي مركز الحامل مركز معدل
المسير بحركته على محيط حامل مركز الحامل فينطبق محيط أحدهما
على الآخر ثم اذا تقارعا عن المقابلة وابتدأ كل بالحركة
في نصف الدور الى تربيعها لقي المركز الحضيض مرة أخرى فاذا
تحركا عنه اجتماعنده في تلك الدرجة كرة ثانية وبعد
دوران أفلاك عطارد دورة تامة يرتسم من مركز



التدوير مدار اقليلخي بيضي كما في القمر
وهذا شكله فظاهر ان البعد الابعد
لمركز التدوير عند كوكب الاوج
وهما متقارنان معا واقرب
الاقرب له فليس في مقابلتهما
وان كان في الجملة هناك ولا في تربيعي
الاوج الممثلي كما كان للقمر في بعد المضعف
عندهما بل عند موضعي تثليثيه حيث يتركب الحضيض
فاذا قارن المركز الحضيض المدبيك وكان سايرا الى الحضيض
الممثلي او بالعكس بلغ فيما بينهما احد موضعي القرب له او البعد
ظهر ان في كل سنة شمسية يقطع مركز تدوير عطارد محيط حامله
مرتين كقطع مركز تدوير القمر منطقة حامله في شهر مرتين
ومنها الاختلاف الاول المسمى بالتعديل الثاني والمفرد ومنها
الاختلاف الثاني وهو اختلاف البعد الابعد والاقرب ومنها
الاختلاف الثالث وهو تعديل المركز والخاصة وقد عدت
كلا منها في الفصل السابق فنقس عليه هذه وصورة افلاكه
مستمرا على الدوائر تكون هكذا



هكذا
وهي اربعة الممثل والمايل
والحامل ومعدل
المسير والتدوير
فافلاك الكواكب
المتبعة جملة تكون
اثنين وعشرين وان كانت
دوائره اثنان وثلثون اما للعلوية والزهرة فمن الاول
لكل ثلثة ومن الثاني خمسة واما للشمس فمن الاول والثاني
من كل اثنان واما لعطارد والقمر فمن الاول لكل اربعة و
من الثاني للاول ستة وللثاني اربعة والمجموع اربعة وخمسون

المبحث التاسع في امور تعرض للكواكب

ايضا وتتعلق بافلاكها وفيه اربعة فصول الفصل
الاول في عرض الكواكب وميول اقطار التداوير اما
عرض الكوكب فهو بسبب ميل فلكه المايل عن فلك البروج
ويسمى عرض الخارج المركز وغايته للقمر خمسة اجزاء و
لعطارد نصف وربع جزء وللزهرة سدس جزء وللمريخ



التدوير مدار اقليلي بيضي كما في القمر
وهذا شكله فظاهر ان البعد الابعد
لمركز التدوير عند كوكب الاوج
وهما متقارنان معا واقرب
الاقرب له فليس في مقابلتهما
ان كان في الجمعة هناك والا في تربيعي
الاوج الممثل كما كان للقمر في بعد الحضيض
عندهما بل عند موضعي تثليثيه حيث يتركب الحضيضان
فاذا قارن المركز الحضيض المدير ك وكان سايرا الى الحضيض
الممثل او بالعكس بلغ فيما بينهما احد موضعي القرب له او بعيدا
ظهر ان في كل سنة شمسية يقطع مركز تدوير عطارد محيط حامله
مرتين كقطع مركز تدوير القمر منطقة حامله في شهر مرتين
ومنها الاختلاف الاول المسمى بالتعديل الثاني والمفرد ومنها
الاختلاف الثاني وهو اختلاف البعد الابعد والاقرب ومنها
الاختلاف الثالث وهو تعديل المركز والخاصة وقد عرفت
كلا منهما في الفصل السابق فنقيس عليه هذه وصورة افلاكه
مستمدا على الدوائر تكون هكذا



هكذا
وهي اربعة الممثل والمايل
والحامل ومعدل
المسير والتدوير
فافلاك الكواكب
المتبعة ثمانية تكون
اثنين وعشرين وان كانت
دوائر فاثنان وثلثون اما للعلوية والزهرة فمن الاول
لكل ثلثة ومن الثاني خمسة واما للشمس فمن الاول والثاني
من كل اثنان واما لعطارد والقمر فمن الاول لكل اربعة و
من الثاني للاول سنة وللثاني اربعة والمجموع اربعة وخمسون

المبحث التاسع في امور تعرض للكواكب

ايضا وتتعلق بافلاكها وفيه اربعة فصول الفصل
الاول في عرض الكواكب وميول اقطار التداوير اما
عرض الكوكب فهو بسبب ميل فلكه المايل عن فلك البروج
ويسمى عرض الخارج المركز وغايته للقمر خمسة اجزاء و
لعطارد نصف وربع جزء وللزهرة سدس جزء والمريخ

جزؤ واحد وللمشتري جزء ونصف ولزحل جزآن ونصف وهذا
الميل غير ثابت في السفلين وذلك يكون بسبب قرب منطقتي
مايلها من منطقتي مستقلها وانطباقها عليها وتجاوزها عنها في الجهة
الاخرى منها الى ان يبلغا غايتي ميلها فيرجعان عنها متقاربين
منها الى انطباقهما عليها ثانيا وتجاوزهما عنها في الجهة الاولى
الى ان يبلغا وضعتيها الاولين ويتم هذا القرب والبعد
الى الانطباق في كل سنة شمسية مرة واحدة مثلا اذا بلغ مركز
تدويرهما احدى العقدتين كانت المنطقتان منطبقتين
فاذا جاوزها ابتداء نصف المايل الذي يبتدأ المركز فيه
بالسير من الانطباق الى الميل الى الشمال ابدا ان كان المايل
للزهرة والى الجنوب ان كان لعطارد ونصفه الآخر يميل
بالخلاف ثم يزداد هذا الميل الى ان يبلغ المركز منتصف ما بين
العقدتين وحينئذ ينتهي المايل غايته فيتناقص الميل بعدها
والمركز سايح الى العقدة الاخرى فاذا بلغ اليها انطبق المايل
على الممثل ثانيا فاذا فارقها عادت الحالة الاولى بعينها فظهر
انه يلزم ان يكون مركز تدوير الزهرة بعد مفارقته الراس
شمالا عن فلك البروج ابدا ومركز تدوير عطارد بعد مفارقة
الذنب

الذنب جنوبيا ابدا فلا يكون للزهرة الى عقدة الراس ولعطارد
الى عقدة الذنب وكل واحدة من تينك الحركتين محتاج الى
محول وامتداد الميل هو ميل القطر المار بذروة تداوير
المحدبة وحضيضاتها عن انطباق الافلاك المايلة اما في العلوية
فبتبعيد الاذرى وهي طرف القطر بالميل الى جهة منطقة البروج
والحضيض الى خلافها عند مفارقة مركز التدوير احدى
العقدتين وتنتهي غاياتها في منتصفها ومقدار الزاوية
الحادثة من تقاطع سطحي منطقة التدوير والمايل في هذا
الوضع من محيط دايرة قاطعة للتدوير مارة بالذروة
والحضيض لزحل اربعة اجزاء ونصف وللمشتري جزآن ونصف
وللمريخ جزآن وربع وان كان ذلك المقدار في الزوية عند
مركز العالم اقل منه بكثير واما في السفلين فيتبدأ الذروة
اعني طرف القطر بالميل عند مفارقة مركز التدويرين
الاقرب والابعد وعندهما غايتا ميل الفلك المايل عن منطقة
البروج فان كانت الغاية هي التي عند الاوج اخذت ذروة التدوير
بالميل للزهرة الى الشمال ولعطارد الى الجنوب وان كانت
هي الحضيض فبالخلاف فيهما ويزداد ذلك الميل الى ان

شبكة الألوكة
www.alukah.net

ان ينتهي مركز تدويرها احدى العقدتين فيعود التدوير الى
جهة الميل فيتناقص الميل الى ان ينطبق القطر المذكور عند
الغاية الاخرى على سطح المايل فافهم ومقدار ذاويتي تقاطع السطحين
عند المنتهى من محيط القاطعة للتدوير للزهرة جزآن ونصف
ولعطارد ستة اجزاء وربع وان كان في الرؤية عند مركز
العالم اقل ويسمى هذا العرض بالميل وعرض التدوير وهو
ايضا القطر المار بمركز التدوير المتقاطعين القايم على القطر
المذكور الموازي للخط الواصل بين البعدين الاوسطين
منه لا يثبت في سطح المايل والممثل الا عند كون مركزي
التدويرين مع احدى العقدتين فاذا فارقاها يبتدئ الطرف
الغربي ويعرف بالمسايي للزهرة بالانحراف الى الشمال
ولعطارد الى الجنوب فالطرف الشرقي ويعرف بالصباحي
منهما يكون بالخلاف ويزداد الميل الى ان ينتهي الغاية في
منتصف ما بينهما عند الاوج ثم يعود ويتناقص الى ان يبلغا
العقدة الاخرى فيخرج القطر الى سطح المايل والممثل ثم اذا
فارقاها يبتدئ الطرف المسايي للزهرة الى الجنوب ولعطارد
الى الشمال فالصباحي منهما بالخلاف ويزداد الى ان يبلغ الغاية

في المنتصف عند الحضيض ثم يتناقص الى ان يعود الى الوضع
الاول وغاية الانحراف وهي زاوية تقاطع سطح التدوير سطحا
آخر منه يمر بمركزه ويسمى منطقة الانحراف وهي توازي
منطقة البروج للزهرة ثلثة اجزاء ونصف ولعطارد ستة
اجزاء وان كان في الرؤية عند مركز الكل اقل منه ويعرف
هذا العرض بالانحراف والروّاب والانتواء والالتفاف
ستين تمام مدة انه ينبغي ان يكون لكل منهما محرك وان الفلك
الحامل وقطبي التدوير يتمامان دورتهما معا وان مدة
حركات الاربع متساوية وان عرض الانحراف والذروة
متساويان في المبدإ والمنتهى الفصل الثاني في
الاوجات والحضيض وذكر مواضعها واختلف فيها بناء على
اختلاف حركة الثوابت فقالوا ان رأسي زحل والمشتري
متقدمان على أوجيهما اما الاول فبماية واربعين درجة
واما الثاني فبستين منها ورأسي المريخ والزهرة كذلك
لكن كل بربع دور ورأس عطارد متأخر عن اوجه بربع
دور ولزم ان يكون اوجات الكواكب الثلثة الاخيرة
عند غاية ميل المايل وهذه الاوجات ماخلا اوج عطارد

كلها في النصف الشمالي من الفلك المائل وهي متحركة بالحركة الثانية
البطيئة ومواضعها في سنة الف وستماية واثنتين وخمسين
اسكندرية الموافقة لسبعة ماية وعشرة يزدجردية امتا
الاوجات وهو للشمس في الجوزاء كوكبة ولزحل في القوس بكر
وللمشتري في السنبلة كط ح وللمريخ في الاسد لو ح وللزهرة
في الجوزاء ط ط ك وللعطارد في العقرب دم واما
الجوزهرات فليظهر عليك مواضعها بعد معرفة مواضع الاوجات
وتقديم نائب كل كوكب وتاخيره عنها والمراد بالتقدم كونه
اقرب الى المغرب اذا كان فوق الارض وبالتاخر خلافه
الفصل الثالث في رجوع الكواكب واستقامتها
واقامتها في الرؤية اعلم ان الكوكب اذا بلغ مبدا القسم
الاعلى من تدويره وهو القسم الذي يتوسطه الذروة و
عندها وسط قوس الاستقامة واحراق المحيرة فحينئذ يكون
حركة مركزه موافقة لحركة مركز التدوير في جهة توالي البروج
فيرى مستقيما في صعوده متدرجا الى السرعة فيشرع في السير
ثم ينقص منه قليلا قليلا الى ان يقرب مبدا القسم الاسفل
منه الذي يتوسطه الحضيض وعنده وسط قوس التجوع

ومقابلة العلوية الشمس واحتراق السفليين ايضا فحينئذ يميل الى
خلاف التوالي فما دام حركته اليه تكون اقل من حركة مركز
التدوير الى التوالي يرى ايضا مستقيما لكن بطئ السير الى
ان تصير حركتهما في الجهتين متساويتين في المقدار وحينئذ
يكون واقفا الى ان يزيد حركة مركزه على حركة مركز التدوير
فيرى راجعا عن صوبه نازلا في سيره الى الشرعة عند الحضيض
ثم يبطؤ قليلا قليلا فيقف عند تساوي الحركتين ثانيا ثم يستقيم
مدة اخرى وهكذا ابدا يستقيم ويرجع ويقف مرتين في دورة
واحدة مع عدم تغيير في حركته على محيط التدوير البتة
وشكله هكذا ولما كان حركة مركز

جزء العصر على محيط تدويره
اصغر من حركة مركز التدوير
على محيط حامله لا يدرك من
العصر رجوع بل يطؤ سيره في النصف
الاعلى من التدوير الفصل
الرابع في تشريق الكواكب وتغريبها اما الاول فهو عبارة
عن ظهور الكواكب في جهة المشرق بالغداة قبل طلوع الشمس

واما الثاني فهو ظهوره في جهة المغرب بالعشية بعد غروبها
وحدهما في الجهتين الى ان يصير البعد بين الكوكب والشمس
ستين درجة وبعده لا يستمر مشرقا ولا مغربا وقيل الى ان يصير
البعد بينهما ستين درجة اما في الكواكب العلوية فكلاهما يعرض
لها وهي مستقيمة لان الشمس يسيرها اذا قارنت احدها فهو
يكون متوجها الى درجة تدويره فحينئذ نراه طفق يختفي تحت
الشعاع في جهة المغرب فهو مغرب ثم اذا احترق عند الدرجة
سبقته الشمس لسرعة سيرها وحينئذ يظهر ذلك الكوكب
في جهة المشرق فهو مشرق وقس عليه الثواب الغير الابدية
الظهور والخفاء اما لان الشمس تلحقها وتجاوز عنها واما
في السفلين فابتداء تغريبها في درجة تدويرها وهما مستقيمان
الا ان يختفيا تحت الشعاع ثانيا للاحتراق ايضا لكن في حضيض
تدويرهما وهما راجعان وابتداء تشريقها وانتهاؤه يكون
بعكسه ثم اعلم ان سبب عظم الكوكب وصغره وكثرة
ضوئه ومقدار غرضه وقلتها وقربه من مركز العالم وبعده
عنه واختلاف جهته وافقه الى غير ذلك يختلف تشريقه
وتغريبه الى ان لا يختفي بعض الكواكب اصلا وهو محترق

كضياء الهواء وكدورته وكثرة
سيره وبطوءه

محفي

ويختفي بعضها زمانا طويلا فتامل فيه واما في القمر فهو
في القدرة يختفي ليلة اذا كان شمالي العرض وفي نهاية واقرب
قدره وفي برج بطئي العروب وثلث ليال اذا كانت الامور
اكثرها بضد ذلك وليلتين وهذا اكثري الوقوع وقد
اعتبر فوجد محدود ظهور المتحيرة والقمر والكواكب
القدر الاول وخفائها حيث يكون الارتفاع عند طلوع
الشمس او عند غروبها لزحل احدى وعشرون جزءا للمريخ
عشرة اجزاء للمريخ احد عشر جزءا ونصفا للزهرة خمسة
اجزاء لعطارد عشرة اجزاء للقمر ثمانية اجزاء مرئية و
للكواكب القدر الاول اذا كانت على المنطقة او بالقرب منها
خمسة عشر اجزاء ثم اعلم ان المتحيرة اذا قارنت
الشمس في درجة تسمى هذه اجتراقا وان القمر اذا قارنها
يسمى اجتماعا واذا قابلها يسمى استقبالا فاذا قارنت كوكبا
كوكبا ولم يكن لهما عرض فالادنى يكسف الاعلى وان كان
خطين خارجين من مركز العالم مارين بمركزي الكوكبين المتحيرين
الى الفلك الاعلى ثم تتوهم دائرة عرض تمر بطرف احدهما فان
مرت بطرف الآخر فهما متقارنان

لا بالجلد والهوت والثور والاولو

لا دون فان الكوكب يحترق

في اختلاف نور القمر وخسوفه وكسوف الشمس وفيه ثلثة
فصول الفصل الاول في الاختلاف اعلم انه لما كان اختلاف
تشكلات نور القمر وزيادته ونقصانه من استهلاله الى استدارته
بسبب اختلاف وضعه من الشمس علم ان جرمه كالمد غير مضيء في نفسه
يقبل ضوء الشمس لكثافته وينعكس عنه لصقالته كالمرآة المحاذية
لشعاع الشمس فيلزم ان يكون نصف كرة جرم القمر ابدا مضيئا
بضياء الشمس مواجها لها ونصفه الآخر مظلما والفصل المشترك بينهما
دائرة قاطعة للقمر تسمى دائرة الظلام وايضا يلزم بالنسبة الى
الناظر ان يكون نصف جرمه مرئيا ونصفه الآخر غير مرئي والفصل
المشترك بينهما ايضا دائرة قاطعة له تسمى دائرة الرؤية
فهاتان الدائرتان منطبقتان في الاجتماع وحينئذ يكون نصف
المظلم من تحت يلينا والقمر بيننا وبين الشمس ويطلق عليه
المحاق فاذا انحرف عن محاذاة الشمس وبعد عنها وتقاطع
الدائرتان عن الانطباق يظهر علينا من نصف المضيء الفوقاني
قطعة هلالية مضيئة يحيط بها نصفا الدائرتين ويزداد كل ليلة
بازدياد الزاوية الحادثة من تقاطعها ويختفي في نصف
المظلم بقدرها الى ان يبلغ مربع الشمس فيظهر علينا من نصفه
المضي

المضي نصف ويختفي من نصف المظلم نصف وحينئذ يصير الزاوية
الحادثة تماما ويتركب الصفحة المرئية اعني النصف المرئي منه
من ربع مضيء وربع مظلم ثم يزداد الربع المضيء لانفراج الزاوية
القائمة وينتقص المظلم كل ليلة الى ان يبلغ المستقبل وهو غاية
البعد عن الشمس فيظهر علينا نصف المضيء منه ونحن من النيرين
ويطلق عليه البدر وحينئذ يتطابق الدائرتان مرة اخرى
فاذن علمت ان النصف المضيء الذي كان عند الاجتماع من فوق
نزل ههنا الى تحت والمظلم بالعكس ثم يتقاطع الدائرتان مرة
اخرى وجعل يقرب القمر من الشمس ويتبادل النصفان مندرجا
على الترتيب المذكور بعينه لكن يظهر علينا اولا من نصف المظلم
قطعة يحيط بها نصفا الدائرتين ايضا ويختفي من
من نصفه المضيء بقدرها ويزداد بازدياد
الحادة الى التربيع الثاني فيصير
الحالة قائمة ويتركب الصفحة المرئية
من الربعين المذكورين ثم يزداد
الربع المظلم لانفراج زاويته وينقص
المضيء كل ليلة الى ان يبلغ الاجتماع وينمحي مرة ثانية

شبكة الألوكة
www.alukah.net

الفصل الثانى فى الخسوف ينبغى أن نعلم ان كرة الارض جسم
مظلم كثيف وان لها ظلا مخروطا مستديرا يقع فى مقابلة جهة الشمس
ملازما مركز ذلك المخروط اعنى راسه لمنطقة البروج فاذا تقاطر
النيران على نفس العقدتين او على بعد منها يكون عنده الخسوف يمنع
الارض ضوء الشمس عن القمر لوقوعه حينئذ فى ظلها فيعود الى ظلامه
الاصلى وهو الخسوف ثم نتوهم ان دايرة الرؤية حيثما يقطع مخروط
الظل يحدث دايرة تسمى دايرة الظل مركزها على منطقة البروج
ومحاذية لقاعدة المخروط المحيطة بالارض حيث ينبعث
منه الظل وفى كل بعد تفرض يكون قطر دايرة الظل مثلثى
قطر صفحة القمر وثلثه اخماسه فاذا امكن خسوف عند
استقبال نعتبر العرض الحقيقى للقمر بانه اما ان يكون اكثر
من نصفى قطر صفحة القمر وقطر دايرة الظل او مساويا
لها او اقل منهما لكن على هذا التقدير لا يخلو اما ان يكون مساويا
لنصف قطر الظل او مساويا لفضل نصف قطر على نصف قطر
صفحة القمر او اقل من ذلك وعلى التقدير الاول لا يقع خسوف
ولا مماسة القمر دايرة الظل وعلى الثانى لا يقع الا مماسة فقط
وعلى الثالث يخسف نصف قطر القمر وحينئذ يكون مركز جرم
القمر

القمر على محيط دايرة الظل وعلى الرابع يخسف القمر كله
ويماس سطحه دايرة الظل من داخل ولا يمكث وعلى الخامس
يخسف ويمكث بقدر ما يقع جرم القمر داخل الظل هذا اذا كان
للقمر عرض اما اذا لم يكن له عرض فهو يقع على نفس العقدة فيخسف
كله ويمكث غاية مكثه ولما كان حد الخسوف من جانبى العقدتين
الى اثنى عشر جزءا فاذا وقع خسوف على اقل منه امكن ان يخسف
من ثانية بعد خمسة اشهر واما وقوع الخسوفين بينهما ستة
اشهر فكثير الوقوع واما وقوعهما وبينهما شهر واحد او سبعة اشهر
فهو غير ممكن وخسوف
القمر لا يختلف باختلاف
البلدان بخلاف
او قارنه وابتداؤه
يكون من طرفه
الشرقى وانجلاؤه
لذلك وهذا شكل الخسوف

الفصل الثالث
فى الكسوف اذا وقع اجتماع مدينتى نهارا بحيث يتوسط جرم

القمر بين ابصارنا والشمس حجب نورها عنا فيرانيا هاعديمة
الضوء بسبب الحاجب اعني الصفحة المظلمة للقمر التي تلينا وهو
كسوف الشمس ثم اذا اعتبرنا العرض المرئي للقمر عند الاجتماع
المرئي فهو لا يخلو من أن يكون اكثر من نصفي قطري صفحتي
النيرين او مساويا لهما او اقل منهما وعلى الاول لا يلزم كسوف
ولا مماسة جرمي النيرين وعلى الثاني لا يقع الا مماسة بينهما
وعلى الثالث يقع كسوف بقدر نقصان العرض عن نصفي القطرين
فينكسف بعض جرمها فاذا اتفق اجتماع كسوفي بحيث يمر الخط
الشعاعي الخارج من منظر الابصار الى مركزي النيرين فحينئذ
لا يخلو من أن يكون قطر احدهما مساويا في الرؤية او كان قطر
الشمس اكبر من قطر القمر او كان اصغر وعلى الاول ينكسف
الشمس كلها ولا يمكث ثم فحينئذ يكون راس مخروط ظل القمر
عند البصر وعلى الثاني ينكسف ويبقى من صفحتها حلقة نورانية
غلظها يكون بقدر نصف فضل قطرها على قطر القمر وراس
الظل حينئذ يكون على الخط الشعاعي على بعد عال بينه وبين
البصر وعلى الثالث ينكسف مع مكث تام وهو يكون بقدر فضل
قطر القمر على قطر الشمس وهو قليل وراس المخروط حينئذ
يكون

يكون اسفل من سطح الارض والبصر يقع في دائرة
من مخروط الظل قاطعة له وبسبب اختلاف منظر القمر
يمكن ان يقع كسوف بالنسبة الى بلد دون آخر ويختلف قدر الكسوف
وزمانه ايضا لاختلاف وضع المراكز والكاسف المتوسط بين
الشمس وابصارهم ثم اعلم انه يختلف حدود الكسوف من
جانبي العقدتين باختلاف المراكز لاعتبار العرض المرئي
ههنا ففي الاقليم الرابع يمكن وقوع كسوف بعد الراس او
قبل الذنب بثماني عشرة درجة او قبل الراس وبعد الذنب بسبع
درجات فلهذا امكن وقوع كسوفين بينهما خمسة اشهر
او سبعة منها احدهما اما بعد الراس
او قبل الذنب والآخر اما قبله
او بعد الراس واما وقوعهما
وبينهما ستة اشهر ووقوع
خسوف وكسوف لا كسوفين
هو اقرب الى الامكان والطرف
الغربي للشمس يبدأ بالكسف ابدا ويخلي
منه ايضا ومن هذا الشكل يتصور كيفية الكسوف

المقصد الثاني في تقدير احوال الارض وما يتبعها وفيه سبعة مباحث

المبحث الاول في ذكر ما هو معمور من الارض وغير معمور في الماء وتقسيمه الى الاقاليم السبعة وطول كل منها وعرضه

قد مر ان الارض بجملتها كرية فلنفرض عليها ثلث دوائر عظام احديها في سطح معدل النهار تنصف كرة الارض الى شمالي وجنوبي تسمى خط الاستواء وثانية سطح افق خط الاستواء مارة بقطبي الاولى وبطرفي العمارة تنصف الارض ايضا بنصفين فوق واسفل فهي بها تصير اربا عا احد الربعين الشماليين هو الربع المسكون والاربع الاخر مغمور في الماء وثالثة النهار مارة باقطاب الاوليين تنصف الارض بل الربع المعمور الى شرقي وغربي وتقطع الاولى على نقطة عند منتصف نصفها يسمى قبة الارض وطول الربع المعمور اية وثمانون درجة وابتداؤه ان اعتبر من جانب المغرب فهو اما من ساحل البحر المحيط او من جزاير الخالدات الواقعة في البحر بينها وبين الساحل عشر درجات فبسبب الاختلاف في المبدا تختلف قبة الارض بقدره وعرضه يكون غير ان معظم العمارة الى ستة وستين درجة وابتداؤه من خط الاستواء لانه متعين بالطبع

دون

دون ما عداه وهذا الربع المحدود بالنهايات المذكورة ينقسم سبعة اقسام طول كل قسم من المشرق الى المغرب وليسمى اقليما فهو قطعة من سطح الارض محصورة فيما بين نصفي دايرتين متوازيتين ومتوازيتين لخط الاستواء وعرضه قوس من الدايرة المارة بقبة الارض في جهة الشمال الى آخر العمارة وهي في سطح نصف النهار ومن هذا الشكل يتصور الاقاليم السبعة ثم اعلم مبادي الاقاليم واواسطها بحسب العرض وساعات النهار الاطول فمبدا الاقليم الاول اما من نفس خط الاستواء او من نهاره ابدا اثنا عشر ساعة واما حيث النهار الاطول اثنا عشرة ساعة ونصف وربع والعرض اثنا عشرة درجة وثلثا درجة ووسطه بلا خلاف فيه حيث النهار ثلث عشرة ساعة وعرضه ست عشرة درجة ونصف وثمن وآخره هو اول الثاني وهكذا في البواقي ومبدا الثاني حيث النهار ثلث عشرة

ساعة وربع والعرض عشرون وربع وخمس ووسط حيث
النهار ثلث عشرة ونصف والعرض اربع وعشرون ونصف
وسدس ومبدأ الثالث حيث النهار ثلث عشرة ونصف
وربع وعرضه سبعة وعشرون ونصف ووسط حيث النهار
اربع عشرة والعرض ثلثون وثلثان ومبدأ الرابع حيث
النهار اربع عشرة وربع والعرض ثلث وثلثون ونصف وثمن ووسط
حيث النهار اربع عشرة ونصف وعرضه ستة وثلثون وخمس
وسدس ومبدأ الخامس حيث النهار اربع عشرة
ونصف وربع وعرضه تسع وثلثون الا عشر ووسط حيث
النهار خمس عشرة وعرضه احدى واربعون وربع ومبدأ
السادس حيث النهار خمس عشرة وربع وعرضه ثلث واربعون
وربع وثمن ووسطه حيث النهار خمس عشرة ونصف و
عرضه خمس واربعون وربع وعشر ومبدأ السابع حيث
النهار خمس عشرة ونصف وربع وعرضه سبع واربعون و
خمس ووسط حيث النهار ست عشرة وعرضه ثمانى واربعون
ونصف وربع وثمن وآخره وهو آخر العمارة على راى حيث
النهار الاطول ست عشرة وربع وعرضه خمسون وثلث وعند
بعض

قوله على راى يعنى اذا كان المبدأ حفظ الاستواء

يعرض الى حيث العرض خمس وخمسون وثلث والمشهور ان منتهى
العمارة حيث العرض ثلث وستون وبعد معرفة عروض
اوائل الاقاليم واواسطها وتحصيل معرفة عرض البلد وطوله
تظهر عليك انه فى اى اقليم من الاقاليم السبعة ويتعين موقعه
منه واذا صار عرض ما بين راس بداية الاقليم الاول الى وسط
وما بين وسط التاسع الى آخره اكثر لتفرق العمارة بينهما وبهذا
السبب لا يعدون ما وراء آخر الاستواء من العمارات الموجودة
الا بعد نوكه من الاقاليم مع انهم وجدوا فى عرض سبع وعرض
سبعة وعرض ستون هذا ما يتعلق بالمبحث الثانى

المبحث الثانى

فى ذكر المواضع التى هى على حفظ الاستواء وخواصها اعلم ان
منطقة معدل النهار لما تمت بسمت رؤوس سكان المواضع التى
هى على حفظ الاستواء فلذلك تنطبق على دوايرا فاقهم على دوايا
قوايم وقطباها منطبقين على قطبى الشمال والجنوب وهى
تتحد بدايرة اول حملهم وسطوح دوايرا فاقها تنصف
المعدل والمدارات اليومية بأجمعها فيتساوى قوس النهار و
قوس الليل فى جميع السنة وكذا زمان ظهور كل نقطة وزمان
خفايها بالحركة الاولى الملاكل طالع وغارب عيرا على القطبين

شبكة الألوكة
www.alukah.net

فلا يتصور ثم ابدت الظهور أو الخفاء والشمس تسمت بسمت الرأس
وهي في احد المعتدلين وحينئذ لا سمت لارتفاعها ولا ظل
للاشخاص وهي في نصف النهار ولا تميل الى شمال المعدل والى
جنوبه الا بقدر الميل الكلي وذلك اذا كانت في المنقلبين ولا ينقص
غاية ارتفاعها عن تمامه وتكون نصف السنة شمالية عنه والظل في
نصف النهار منبسط الى الجنوب وفي نصف آخر بالخلاف فيهما
وظلا النهارين بل ظل كل جزئين متقابلين متساويان واذا
بلغ احد المعتدلين سمت الرأس صار المارة بالاوتاد منطبقا
على الافق فتطبا البروج ايضا عليه بيد احدهما المغرب والآخر
الطلوع وحينئذ يكون منطقة البروج والافق متقاطعتان على
قوائم ونصف النهار ينصف النصف الظاهر منهما فعند مرور احد
نصفي فلك البروج في جهة على نصف النهار يصير احد قطبيه
ظاهرا ان يقع لكن في جهة اخرى ولا يزيد ارتفاعهما في الجهتين
على الميل الكلي فغاية ارتفاع القطب الجنوبي وانحطاط
الشمالي اذا كان المنقلب الصيفي على نصف النهار وبالعكس
اذا كان الشتوي عليه ولما كانت الشمس تقرب الى سمت الرأس
في تلك الاقاليم مرتين وتبعد عنه مرتين فيتوسط بين كل قرب
وبعد

ان يكون الشمس جنوبية والظل منبسط الى الشمال

وبعد ايضا مرتين يلزم هناك ثمانية فصول وهي صيفان وشتاآن
وربيعان وخريفان واذا كان دائر افق تلك البقاع دائر
الميل فقوس ميل كل نقطة من الفلك تكون بقدر سعة مشرقها
او سعة مغربها وفي آفاق هذه المواضع يكون دور الفلك دوريا
وقد مر ذكره وهي اعدل البقاع ان اعتبر تشابه احوالها او
الا فلم الدوائر ان اعتبر تكافؤ كيفيتها

المبحث الثالث

في ذكر المواضع التي لها عرض وتسمى بالآفاق المائلة وهي ثلثة
اقسام لان الموضع الذي هو ذو عرض لا يخلو اما ان يكون عرضه
اقل من الميل الكلي او مساويا له او اكثر منه واقل من تمامه او
مساويا لتمامه او اكثر منه واقل من الربع ويلزم في هذه المواضع
الخمسة ان يقع كل موضع تحت مدار بين خط الاستواء واحد
قطبي العالم فيكون دور الفلك هناك حماليا وقد عرفته
وان يكون ارتفاع القطب الظاهر منها بقدر عرض البلد
وانحطاط الخفي مثله ويكون بعد المدارات الابدية الظهور
والخفاء عن المعدل اكثر من تمام عرض البلد لكن بعد اعظمها
المحيط بها المماس للافق يكون مساويا له ونصف النهار
ينصف تلك المدارات فقطعها الاقرب الى سمت الرأس

موضع غاية ارتفاع الكوكب الابدي الظهور والابعد منتهاه هو
موضع غاية انحطاطه وافق البلد يقسم المدارات الاخرى التي
بعدها اقل من تمام العرض الى مختلفين اعظمها القسم الظاهر
لكن من كل مدار واقع منها في جهة البلد والقسم الخفي منها لكن
في خلاف جهته ويتساوى القسم الظاهر مع الخفي لكن من مدار
متساويي البعد عن المعدل في الجهتين وكلما ازداد عرض
البلد يزداد التفاوت بين القسي الظاهرة والخفية بالمزيد
ارتفاع القطب وانحطاطه فيزداد التفاوت بين الموسمين
وينتقص اقسام القسمين الظاهر والخفي المذكورين من
المدارات كلما اقتربت الى المعدل وتتساويا في القسمين الاخيرين
المتعادلين منها بالقرب منه ايضا فظهر ان لكل قسم من
مدار بالنسبة الى قسم من مدار آخر ظاهرين او خفيين في
جهة واحدة تفاضلا او تناقصا ويقع تعديل النهار المذكور
ومن ثم لزم تزايد زمان النهار وتناقص زمان الليل
من ابتداء حلول الشمس المنقلب الذي في جهة القطب الخفي الى
ان يتم نصف دورتها ويحل المنقلب الآخر وحينئذ يكون النهار
اطول ما يمكن والليل اقصر الليالي ثم يبتدأ النهار بالتناقص
والليل

يعني خفي القسم الظاهر المذكور وظاهر القسم الخفي المذكور

والليل بالتزايد الى ان يتم نصف دورتها الآخر ويحل المبدأ
الذي فارقه فاذن يقع الليل اطول الليالي والنهار اقصر
النهار ولا يتساويان الا عند حلولها احد نقطتي الاعتدالين
ساعة طلوعها او غروبها فظهر من هذا التقرير ان نهار
كل جزء من مدار يساوي ليل نظيره وبالعكس وان
نهارات كل جزئين من مدار وهما متساويا البعد عن المعدل
في جهة متساويان وكذلك ليلاتهما ثم اعلم ان كل مدار
في جهة القطب الظاهر لا يخلو اما ان يكون بعده عن المعدل
اكثر من عرض البلد او مساويا له او اقل منه وعلى الاول
فهو لا يلاقي دائرة اول السموت عند سمت الراس بل تمتد
عنه في جهة القطب المرتفع وعلى الثاني فهو يماس اول
السموت عند وعلى الثالث فهو يقطع اول السموت
فما دام الكوكب في القوس التي بين نقطتي تقاطعهما من
مداره يكون في جهة القطب الخفي عن دائرة اول السموت
واعتبر الاقسام ثلثتها اذا كان المدار في جهة القطب
الخفي لكن بالنسبة الى سمت الرجل ولا يصل ما يزيد على
تلك المدارات في هذه الجهة فوق الارض الى دائرة اول

جهة القطب الخفي

المبحث الرابع في ذكر المواضع التي عرضها لا يجاوز الميل الكلي وتقويس خواصها ومنه فصلان الفصل

الأول فيما يكون عرضه أقل من الميل الكلي وهذا الوضع يبلغ الشمس سمت الرأس مرتين عند قطبين عن جنبتي أحد الانقلابين بحاطرفا قوس واقعة بينهما في جهة القطب الظاهر تقاطع عليها مدار جزء الشمس فلك البروج ميلها في تلك الجهة كل مثل عرض البلد ويصغر تلك القوس لتقارب القطبين بسبب زيادة هذا العرض وإذا بلغت إليها ينتفي ظل الزوال ويكون قطبا منطقة البروج على الأفق يريد أن الطلوع والغروب وهي قائمة عليه حينئذ فأشخاص هذا الوضع تكون ذوات ظلين لا ما دامت الشمس في القوس المذكورة من منطقة البروج يبسط الأظلال لا جهة القطب الخفي وقطبها الظاهر هو الذي يكون في تلك الجهة وما دامت في القوس الأخرى منها يقع تلك الأمور بالخلاف فلها غايتا ارتفاعين في التقصان إحداهما أعظم من الأخرى فاهم ولا تساوي الفصول في تلك البقعة ولا متشابهة أيضا وإن زادت على أربعة فكأنها تكاد أن تنحصر في خمسة الفصل الثاني فيما يكون

عرضه مساويا الميل الكلي هنا تمر الشمس بسمت الرأس مرة واحدة وذلك عند انتهائها إلى نقطة الانقلاب التي هي في جهة القطب الظاهر وهناك غاية ارتفاعها في السنة ثم يتناقص إلى الانقلاب الآخر ومنه يتزايد إلى أن عودها إليها مرة ثانية ونقطة الانقلاب على سمت الرأس فحينئذ لا يكون للأشخاص عند نصف النهار ظل أما باقي السنة يكون ظلها لا جهة القطب الظاهر ويكون منطقة البروج قائمة على الأفق متحدة بأول السمت وقطباها متباينان له يكون أحدهما أبدي الظهور يزيد بالارتفاع وغايته بقدر ضعف الميل الكلي والآخر أبدي الخفاء يزيد بالانحطاط وغايته مثل الغاية الأولى وظل الاعتدالين في هذه البقاع كظل أحد الانقلاب الذي هو في جهة القطب الخفي في بقاع أفاق الفلك المستقيم قدرا وجهة وكظل الآخر فيها قدرا فقط لا جهة ولا يزيد الفصول هنا على أربعة لكن الذي عرضه مثل الميل الأعظم في الجنوب أحر من الذي عرضه بقدره في الشمال

المبحث الخامس في بيان خواص المواضع التي يكون عرضها أكثر من الميل الكلي ولا يزيد على ثمانية فيه فصلان الفصل الأول فيما يكون عرضه

زايداً على الميل الكلي وناقصاً من تمامه في هذه المواضع لا تطلع الشمس
سمت الراس وطول هذه السنة غايتا ارتفاعين أعلى واسفل الاول
يساوي مجموع الميل الكلي وتمام عرض البلد والثاني يساوي فضل
تمام العرض على الميل وكذا الارتفاع الاعلى لاحد قطبي البروج
الابدي الظهور عند وصول المنقلب الذي في جهة القطب الخفي
نصف النهار والارتفاع الاسفل عند وصول المنقلب الاخر اليه
وقس عليه انحطاطي الابدي الخفاء منهما واعتبر وقوع الظل
في السنة وطول النهار وقصره فيها كما يقع لانك من بعد خبير
بهاد في هذه المواضع كل كوكب سيار ذي عرض فهو يديره بحركته
الراس مرة ان ساوى عرضه فضل عرض البلد على الميل
الكلي ومرتين ان زاد عليه ولا يتصور ان لا يصل اليه ان زاد
الفضل على عرضه ومن مبدأ العروض اعني ما يلي خط
الاستواء يزداد العروض فيزداد تعديل النهار وسعة
المشرق والمغرب بازدياد ها ويزداد عظم المدارات
الابدية الظهور والخفاء الى ان تصير اعظمها مدار المنقلبين
وانحطاط مدار الشمس عن سمت الراس لجهة القطب الخفي
وبعده مطلع احد الانقلابين ومغيبه عن مطلع الاعتدال

ومغربه ويزيد فضل نهاره على نهار الاعتدال فيكثر التعديل
والسعة المذكوران الفصل الثاني فيما لا يزيد عرضه
على تمام الميل يكون سيارة في تلك البقاع يكون احد مداري المنقلبين
التي في جهة القطب الظاهر ابدي الظهور والاخر ابدي الخفاء وهي
اول عروض يبدو اظلال الاشخاص فيه جهتها ومدار قطب
البروج يمتد ان بسمتي الراس والقدم فاذا وافى منقلب القطب
الظاهر الافق ماسه على قطب اول التموت الذي في جهته والاخر
ماس الاخر وقطبا البروج ممتدين بقطبي الافق ومنطقته منطبقة
عليه وحينئذ يكون احد الاعتدالين على نقطة المشرق والاخر
على المغرب واحد الانقلابين على نقطة الشمال والاخر على الجنوب
ونظيرتاهما من المعدل على نصف النهار احديهما اما في الجنوب
او الشمال فوق الارض والاخرى في المقابلة تحتها فاذا فارق
قطب البروج عن قطب الافق ومال عن سمت الراس نحو
المغرب بحركة الكل يرتفع النصف الشرقي من المنطقة عن
الافق دفعة وينخفض الغربي منها لذلك وتتقاطع معه
الافق على نقطتين متقابلتين فارتفاع احد المنقلبين وانخفض
الاخر فالجزآن اللذان يليانهما يبدان الطلوع والغروب

فالنصف المنخفض من المنطقة يبتدئ بالطلوع دفعة ومطلع جزء
بعد جزء في جميع أجزاء النصف الشرقي من الأفق ويغيب
النصف المرتفع منها كذلك في أجزاء النصف الغربي منه وذلك
في اليوم بليلته فيعود الفلك إلى الوضع الأول فظاهر منه أن طلوع
نصف من منطقة البروج يكون مع دور المعدل وطلوع النصف الآخر
منها يقع في آن ولما كان مدار المنقلب الظاهر ماس الأفق و
لا يغرب ولا ينقطع به فبعد حدوث النهار وتزايده ووصول
الشمس إليه وذلك في السنة مرة واحدة وتدور عليه دورة
كان ذلك اليوم بليلته نهارا كله ولا تغرب وهو النهار الأطول
منها وغاية ارتفاعها في السنة في هذه الدورة عند نصف النهار
تكون بقدر ضعف الميل الكلي والظل دائما متزايدا وبعد
عدوها وتناقص النهار وحدوث الليل ووصولها إلى المنقلب
الآخر الماس للأفق الغير الطالع عنه كان اليوم بليلته ليلا
كله ويفنى الارتفاع ولا تطلع الشمس وهو الليل الأطول ثم
تطلع ويحدث النهار ويبتدئ بالتزايد ثانيا وإذا كان بين
مطلع الاعتدال ومطلع الانقلابين ربعا من الدور بلغ غايتها
بحسب المشرق وتعديل النهار كل ذلك العدد وهذه المواضع

المبحث السادس

آخر العمارة في الشمال

في تقدير أحوال المواضع التي يجاوز عرضها تمام الميل الكلي الى
عرض يبلغ ربع الدور وبيان خواصها وفيه فصلان الفصل
الأول فيما يجاوز عرضها تمام الميل الكلي في هذا العرض يخط
مدار قطب البروج عن سمت الرأس الى جهة القطب الخفي بقدر
زيادة العرض على تمام الميل الكلي فيلزم انحطاط أجزاء دائرة البروج
نحو الأفق وارتفاع أجزاء منها فوقه وهي التي تميلها عن المعدل
الذي من تمام عرض البلد فينقسم منطقة البروج بأربعة أقسام
لانقطاعها بأعظم المدارات الابدية الظهور على نقطتين متساوي
الميل ميل كل كتمام عرض البلد في جهة القطب الظاهر وبأعظم
الابدية الخفاء أيضا على نقطتين كذلك مقابلتين للأوليين في
جهة الخفي أحدى وعشرين التي يتوسطها منقلب الظاهر أبدي الظهور
ومدة قطع الشمس تلك القوس بسيرها الخاص هي طول نهار الأطول
وطرفاها اعني النقطتين المذكورتين بماسان الأفق على قطب
أول الثور بحركة الكل في جهة الظاهر ولا يغيبان وثانيتها
التي يتوسطها المنقلب الآخر ابدية الخفاء فما دامت الشمس فيها
يكون مدة طول الليل الأطول وطرفاها وهما النقطتان ثانيا

على قطبيه الآخر ولا يطلعان وهذان القوسان لا يحيط بهما من
المطالع وثالثها التي يتوسطها الاعتدالي الوسطى يطلع على
الشمالين معكوسة وتغرب مستوية وعلى الجنوبيين فطلع مستوية
وتغرب معكوسة فلها طالع وغارب ورابعها التي يتوسطها الحريفي
بضد ذلك فظاهر أن طلوع كل واحدة من هاتين القوسين يخالف
غروبه فما يطلع منكوسا يغرب مستويا وبالعكس ولما كان الغارب يقابل
الطالع فما يطلع منكوسا يغرب مقابله كذلك وبالضد والكل واضح من
المنقلب وقطبي البروج الظاهرين ارتفاعان اعلى واسفل على نصف النهار
اما اعلاهما في جهة القطب الخفي فللمنقلب يكون مثل تمام عرض البلد
والميل الكلي وللقطب مثله وتمام الميل الكلي ولما اشغالها في جهة القطب
الظاهر فللمنقلب مثل فضل عرض البلد على تمام الميل الكلي وللقطب
مثله لكن على الميل الكلي وكل ما كان أحدهما في ارتفاعه الاسفل فالآخر
يكون في الاعلى فهما في ارتفاعين متبادلين في جهتين مختلفتين عن
سمت الراس ويقع عليه حال المنقلب والقطب الخفيين ويقع
الاظلال في جميع الجهات لكن الى جهة القطب الخفي يكون اطول فمن
هذه البقاع ما يبلغ طول احد الملوين فيه قريبا من ستة اشهر
وعند قرب نهاية العرض فيها لما كان اذ تفاوت العدل عن الافق
قليلا

قليلا وانتقل كوكب قريب المدار من الافق جدا بالحركة الثانية
الى مدار آخر يقطعه بعد ما كان ظاهرا في النصف الشرقي
او يطلع بعد ما كان خفيا في النصف الغربي فيرى فيه في المشرق
وطالعه من المغرب فيستغرب ولتبيين هذه الاوضاع الواقعة
هناك وغروبها أمثل بالمثال الذي مثل به المولى المعلم العلامة
غرة المتأخرين ههنا ايضا ان القوس الاولى من التي الاربعة
المذكورة هي الجوزاء والسرطان والثانية هي القوس و
الحادي والثالثة هي من أول الدلو الى آخر الثور والرابعة
هي من أول الاسد الى آخر العقرب فلنفرض نقطة الافق
الشرقي على نصف النهار من جانب الجنوب في ارتفاعها الاعلى وكان
القطب الظاهر للبروج في الشمال ايضا
عليه في ارتفاعه الادنى وأول الميزان
على مطلع الاعتدال وأول الحمل على
مغربه والنصف الظاهر من فلك
البروج ما بين المغرب والمشرق
في جانب الجنوب على هذا الوضع ثم



ثم يتحط نقطة الانقلاب الصيفي بحركة الكل عن نصف النهار
نحو المغرب ويرتفع قطب البروج نحو الشرق فيطلع الميزان
والعقرب مستويين ويستغرق سعة مشرق آخر إياها الربع
الشرقي الجنوبي ويغرب الحمل والثور مستويين ويستغرق
في الربع المقابل له الى ان يماس الافق احد طرفي كل قوسين
ابدئ الخفاء والظهور وهما اول
القوس على نقطة الجنوب و
اول الجوزاء على نقطة
الشمال وحينئذ يكون النصف
الظاهر من منطقة البروج
وهو فيما بين الشمال والجنوب
في الجانب الغربي وصورته هكذا

فاذا تحرك الفلك عن هذا الوضع يبدأ اول الجوزاء
بالارتفاع عن الافق نحو المشرق ويطلع بعده ما قبله وهو آخر الثور
الى اوله جزءا بعد جزء ثم يطلع آخر الحمل كذلك الى اوله بحيث
يكون مطلع كل جزء منهما اقرب الى مطلع الاعتدال من مطلع الجزء
المتقدم عليه في الطلوع ويستغرق سعة مشرق آخر إياها
الربع

الربع الشرقي الشمالي فينتهي اول الحمل الى مطلعه ويبدأ ما قبالة
وهو اول العقرب بالانحطاط عن الافق ويغرب بعده ما قبله
وهو آخر العقرب الى اوله جزءا بعد جزء ثم تغرب آخر الميزان
كذلك الى اوله بالصفة في الربع المقابل للربع المذكور فينتهي اول
الميزان الى المغرب وحينئذ يكون نقطة الانقلاب الصيفي في ارتفاعه
الاعلى الشمالي على دائرة نصف النهار وقطب البروج في ارتفاعه
الاعلى الجنوبي في النصف الظاهر
من دائرة البروج وهو ما بين
مطلع الاعتدال ومغيبه
في جانب الشمال وهذه صورته

ثم ليتحرك الفلك عن
هذا الوضع فيبدأ آخر الجوزاء
بالطلوع ثم ما قبله وهكذا الى اول الدلو.
مستغرقا ساعة مشرق آخر إياها الربع الشرقي الجنوبي فيغيب
مقابلها تحت الافق وهو من آخر السنبلة ثم ما قبله الى اول الاسد
بالصفة في الربع المقابل فيماس الافق الطرفين الآخرين
من كل قوسين ابدئ الظهور والخفاء وهما اول الدلو على نقطة

الجنوب وأول الاسد على نقطة الشمال والنصف الظاهر من دائرة
البروج فيما بين النقطتين من جانب المشرق مرتبة قد ارتفع
نقطة الانقلاب الصيفي وأقطب البروج بخط
في جهة الغرب على هذه الصورة
فاذا تحرك الفلك عندئذ تبع
أول الاسد مائلا الى النصف الشرقي
فيطلع اجزاؤه متوالية الى آخره ثم
اجزاء السنبلة لا آخرها مستقيما بجهة
مشرقها الربع الشرقي الشمالي فينخفض تحت الافق
مايقابلها وهو من أول الدلو لا آخر الحوت بالصفة في الربع المقابل
فيتم الدور ويعود الوضع الاول بعينه فاول الميزان حينئذ يكون
على مطلع الاعتدال وأول الحمل على مغربه وباقي الامور كما كان
أولا فظهر مما مر أن القوس الثالث المتصل بطرفها يقوس
أبدية الظهور والخفاء مائل الى الشرق يطلع منكوسا والقوس الرابعة
المقابلة لها المتصل بطرفيها ايضا مائل الى الجنوب يغرب كذلك
هذا اذا كان القطب الظاهر شماليا والا فالامر يكون بالعكس
وان الشمس اذا نزلت الاعتدالين تعادل الليل والنهار واذا توجهت

الى جهة الظاهر ازداد النهار على الليل الى النهار الاطول وأما
جهة الخفي كان الامر بالعكس الى الليل الاطول وقد عرفتها
الفصل الثاني في عرض يبلغ ربع الدور وبيان خواصه
في هذا الموضع تواني قطب العالم سمت الرأس وذلك على بسيط
الارض لا يكون الا في موضعين أحدهما نهاية الشمال والآخر نهاية الجنوب
ومنطقة المعدل منطبقة على الافق والفلك دائر بحركته الاولى
دورانا رحويا وبهذه الحركة يبدو الكواكب على توازي الافق
ابدا وجميع أجزاء الافق يمكن أن يكون مشرقا ومغربا للكواكب
بالحركة الثانية فلا يختصان لها بموضع معين فلا يتميز احدهما عن
الآخر ولا يكون للبروج مطالع ومغارب ولا يتعين نصف
النهار وغاية ارتفاع الشمس وانحطاطها لا يزيد على الميل الكلي
وعند بلوغها احد الاعتدالين يكون ظل كل شيء دائرا حوله ويكون
في غاية الطول فاذا بلغت المنقلب الظاهر يصير في غاية القصر
فما دامت الشمس في نصف البروج الذي هو في نصف فلك المعدل
الابدي الظهور يكون نهارا وما دامت في نصف الآخر الذي هو
في النصف الابدي الخفاء منه يكون ليلا فاليوم بليلته مقدار ستتهم
والتفاضل بينهما لا يكون الا بسبب بطوء حركتها في النصف الابعد

شبكة الألوكة
www.alukah.net

وسرعتها في الحضيض فنهارهن سكن تحت القطب الشمالي اطول
من ليله بسبعة ايام بلياليها من ايامنا وايضا مدار حمسين يوما منها
يكون مدة غروب الشفق او طلوع الصبح عليهم ثم الكواكب التي لا عرض
لها تكون في نصف دورتها بالحركة الثانية وهو اثنتا عشرة الف سنة
فوق الافق ومثل هذا القدر تكون تحته واما ذوات العروض فلا
تخلو من ان يكون عروضها اقل من الميل الكلي او مساويا له او زائدا
عليه فعلى الاول يلزم ان يكون لها طلوع وغروب ويختلف دوام
ظهورها وخفائها وعلى الثاني لا يلزم في دورتها الا ثمانية الافق فلا يطلع
او لا يغرب وعلى الثالث لا يكون لها طلوع ولا غروب بل يكون ابدا
اما ظاهرة او خفية لكن تقرب الى الافق وتبعد عنه وتدور على
موازاته دائما وذكر نسك ما مضى من الاوضاع الحادثة من
الحركتين الاوليين وههنا ينتهي العروض وخواصه والله اعلم

المبحث السابع في بيان الطالع والمطالع وذكر

درجة ممر الكواكب بنصف النهار ودرجة طلوعها وغروبها
اما الاول وهو جزء من منطقة البروج يكون على محيط الافق
من جهة المشرق والجزء المقابل له منها على محيطه ايضا
لكن من جهة المغرب وهو الغارب والذي على دائرة وسط

سماء الرؤية هو العاشر من الطالع والذي يكون مقابلا له منها
تحت الارض هو الرابع منه ويطلق على هذه الاجزاء الاربعة
الاوتاد واما الثاني ويسمى الدرجات المطلعية فهو قوس
من معدل النهار تطلع مع اجزاء فلك البروج وسماه الاعداد
التسعي وتلك القوس في امثل الاستواء محصورة بين دائرتي
الحمل احديهما افقهم هي مطالع ما بينهما من دائرة البروج
المستقيم بدرج التواء وايضا ما بعد من المعدل صاعد على نصف
النهار مع درج التواء يكون مساويا لمطالعها الطالعين الافق
واما مطالع درجة من فلك البروج فهو قوس من المعدل
بين اول الحمل والجزء منه الذي اذا طلعت تلك الدرجة
بطلوع هو من المعدل معها واذا كان البروج غير منقسم على
قطبي المعدل يظهر ان ما يطلع من برج من اجزاء المعدل
لا يكون مساويا لما يطلع مع برج آخر قاما اذا بلغ احد الاعتدالين
سمت الرأس وينطبق المارة بالاقطاب على الافق ومنطقة
البروج تقطع الافق على زوايا قائمة عند الانقلابين يطلع
ربع من المعدل مع ربع من البروج وحينئذ يكون نهاريهما
معا على الافق وقس عليه الاقواس الباقية ومطالع كل قوسين

متساويتي البعدين لاحدى النقط الاربع متساويان وكذلك مطالع
كل جزء يساوي مطالع نظيره ويساوي مغاربه واما في الآفاق
المائلة فلا يطلع البروج كالنوم في خط الاستواء لميلان المعدل
عن سمت الرأس وعدم قيامه على الافق بل يطلع بعضه مع
بعض فاذا اتحدا بالاعتدالين اما اذا اتحدا بالانقلابين
فمطالع نصف يوسطه التربيعي ناقص عن مطالع النصف الآخر
الذي يوسطه الحزيفي ويساوي مطالع كل جزءين متساويي
البعد من احدى الاعتدالين في الجهتين لا الانقلابين كمطالع
اول الحوت وآخر الحمل واول السنبلة وآخر الميزان لكن مطالع
كل من الاولين ناقص عن الاخيرين فمطالع كل منهما ومما متساويا
البعد عن الاعتدال التربيعي ناقص بقدر ما يزيد مطالع الجزئين
الآخرين ومما متساويا البعد عن الحزيفي على مجموع مطالعهما بخط
الاستواء وهذا النقصان والزيادة يختلف باختلاف العروض
الى ان ينتهي الى الميل الكلي فالجزآن يوسطها التربيعي ينقص
مطالعهما بالبلد عما لها بالاستواء والجزآن يوسطها الحزيفي بالعكس
ويتفاوت مطالعهما بالبلد ويما متقابلان كمطالع الحمل الميزان
والسنبلة والحوت لكن مجموع مطالع كل من الاولين والاخيرين

متساويا لمجموع مطالعهما ايضا بالاستواء وكذا مجموع مطالعهما
وبيانها على بعد واحد عن جنبتي الانقلابين كمطالعهما به ومطالع
قسي احدى الجهتين في آفاقها كمطالع نظايرها في الجهة الاخرى في
آفاقها وكذا مطالع كل جزء كمغارب نظيره في كل افق وحيث
يبلغ قطب البروج الى سمت الراس وينطبق المنطقة على الافق
مطلع نصف البروج من جهة المشرق دفعة فلا يكون له مطالع
والنصف المنخفض يطلع مع جميع المعدل ولا يكون ايضا للابدية
الظهور والخفاء من البروج نيما ورآء هذا العروض مطالع و
مغارب وكذلك للبروج كلها في عرض تسعين واما
الممر للكواكب
البروج بنصف النهار مع مرور الكوكب به فاذن لا يخلو من ان
يكون الكوكب على نفس المنطقة او ذا عرض وعلى التقدير الثاني
فكانه اما ان يكون احدى الانقلابين او لم يكن وعلى الوضعين
الاولين يكون درجة ممر الكواكب هي التي يرى فيها وعلى الثالث
فدرجة ممره غير درجته التي يرى فيها وحينئذ نظر فان كان
الكوكب في النصف الذي يوسطه الاعتدال الحزيفي شمالي العرض
او جنوبيته فان كان الاول يبلغ نصف النهار بعد درجة ممر

وان كان الثاني يبلغه قبلها وذلك لكون قطب البروج الشمالي
حينئذ
شرقيا عن نصف النهار فيمر دائرة العرض المارة به اولا بالكوكب
في الشمال وبدرجته الكوكب وهو في الجنوب الى
في النصف الآخر وهو الذي يتوسطه الاعتدال الربيعي بالعكس للكوكب
ويقال لما بين درجتي الكوكب من البروج اعني ما بين دائرتي
مثليه فعرضه اختلاف الممر وامتداد طلوعها وغروبها
فرض ما يطلع مع الكوكب من دائرة البروج عن الافق ويغرب
معه وحكمها في اقاليم الفلك المستقيم لحكم درجة الممر على نصف النهار
لانه افق من آفاقها فاذا انطبق المارة بالاقطاب على الافق
ونفرض احد الاعتدالين على سمت الراس يكون الانقلابان مع
قطبي البروج على الافق فالكوكب الوافي اليه حينئذ يطلع ويغرب
مع درجته ثم اذا ابتدأ احد النصفين بالطلوع فالكوكب الذي
يكون في جهة القطب الظاهر للبروج يطلع قبل درجته ويغيب
بعدها والذي في جهة الخفي يكون بالعكس وحكمها في الآفاق
المائلة مثل ما مر ذكره في الفلك المستقيم لكن اذا اعتبر الافاق
يختلف مرور انصاف فلك البروج ومدار قطبه وكذا طلوعها

منها المبحث الثامن في بيان الصبح والشفق

والشفق ومقاديره الايام بلياليها ومقدمة ما يتركب منهما من
الثواني والدقائق والساعات والشهور والسنين وفيه ثلثة فصول الفصل
الاول في الصبح والشفق اعلم ان للارض ظلا مخروطيا في الجهة
المقابلة للشمس غايته دائرة صغيرة تقسم الارض بقسمين
احدهما اكبر مستنير مايلي الشمس والثاني اصغر مظلم مايلي المخروط
والنور والظلمة يتعاقبان حول الارض في اليوم بليلته دورة
فكلما بلغت الشمس سمت الراس يكون راس المخروط في جهة
سمت الرجل وبالعكس وكلما غربت هو يطلع وبالعكس وقس
عليه ما سوى اوضاعها والناظر اذا كان في الليل يقع في وسط
مخروط الظل فاذا مالت الشمس وهي تحت الارض عن سمت
الرجل الى الجانب الشرقي وقربت الى الافق مال مخروط الظل
ايضا عن سمت الراس الى الغرب وقربت الاجزاء المتصلة
بالشعاع المحيط بالمخروط منه اولا ما هو اقرب منها الى
البصر وهو من جانبه الشرقي الذي يلي الشمس مستطيلا مستديرا
لا اسفل وهو الصبح الاول والكاذب ثم اذا اقربت الاجزاء
جدا بسبب قرب الشمس من الافق وزاد الضوء فينبسط
على نصف الافق الشرقي طولا وعرضا يطلع الصبح الصادق

ثم يتلى الافق بالنور فيحمر الى ان يطلع الشمس وحال الشفق
يتصور كحال الصبح لكن بالعكس اذ بعد الغروب يكون حمرة ثم
الضوء المنبسط المستطيل المستدق والبيان ان اقرب جزء من
الاجزاء المستنيرة الى الناظر تقرض سطحا يقطع محدود الظل
ورائه عند سمت الراس ما زال بركز الشمس والارض وسهم
المحدود فيحدث منه مثلث متساوي الساقين وهو ضلعاه
على سطح المحدود وضلعه الآخر قاعدته على الافق المدرك و
يتساوى ابعاد اجزاء الساقين عن الناظر ثم اذا مال الشمس
من تحت الى الافق بحيث يبقى بينها وبينه ثمانية عشر جزء مال
راس المحدود عن سمت الراس بقدر حركتها فيقرب الى
الناظر من ضلعه الشرقي جزء هو نهاية العمود اعني الخارج
عن بصره اليه وهو اقرب الاجزاء المطلوب في هذا الوضع الثاني
تقاطع قاعدة المثلث قاعدته المفروضة في الوضع
الاول ومنه يظهر عليك مثال اقرب جزء من
الظل الضلع الغربي للمثلث في الشفق عند
انحطاط الشمس ثمانية عشر جزء ومن
هذا الشكل تتصور كيفية ما بقي جميعا

لامرين اتصال الضلع بالافق

ثم اعلم ان ساعات
الصبح والشفق
في خط الاستواء
يكون اقل مما
في غيره وتزيد
بازدياد ميل القطب
الظاهر من قطبي البرج
الى ان يتصل آخر الشفق باول الصبح الكاذب
ثم وراء ذلك العرض يطلع الصبح قبل غروب الشفق ثم وراء ذلك
يظهر ضوء الصبح في قوس من الافق في كل دورة وباسره
الشمس ولا تطلع ثم وراءه يظهر الصبح مدة في كل دورة ايضا
ولا يظهر الشمس ثم يخفى الصبح بعدها وكذا العرض تتعين
وتتعرفه والصبح والشفق في بعض هذه العروض لا يتميز
احدهما عن الآخر فما دام في جهة المشرق يكون صبحا وفي المغرب
يكون شفقا الفصل الثاني وهو معرفة الايام والليالي
اليوم اذا اطلق يراد به اليوم بليلته وهو عبارة عن زمان
مفارقة الشمس اية نقطة كانت الى عودها اليها بالحركة الاولى

ومقدارهُ دورٌ من المعدّل بزيادة مطالع ما سارت الشمس من فلك البروج ولمّا كان هذه المطالع مختلفة تختلف مقادير الايام بلياليها فلذلك انقسم اليوم الى الحقيقي وهو زمان عودة نقطة من المعدّل لا نقطة معروضة ثابتة مع زمان مرور مطالع القوس التي تقطعها الشمس في ذلك اليوم بها والى الوسطي وهو زمان عودها الى المعروضة مع زمان مرور قوس مساوية من المعدّل لقوس وسط الشمس تلك النقطة ويقال لتفاوت ما بينهما تعديل الايام بلياليها وزمان النهار ما بين طلوع الشمس الى الغروب ومنه الى الطلوع زمان الليل ثم كل واحد من اليوم والليلة ينقسم الى ساعات مستوية وتسمّى معتدلة وهي ما يؤدون المعدّل في كل منها خمسة عشر جزءاً تقريباً والى مقعّرة وتسمّى زمانية اما المستوية فينقسم قوس النهار او قوس الليل او قوسا دايرهما من الفلك على خمسة عشر ليخرج عدد ساعاتها لذلك اليوم او الليلة او ما ضمّ منهما فهذا العدد الخارج اجزاء من اربعة وعشرين جزءاً من يوم بليلته ولا يختلف اجزاء عدد المستوية بل يكون دايماً كل واحدة منها خمسة عشر جزءاً تقريباً لكن يختلف عدد ساعاتها باختلاف

باختلاف طول النهار وقصره فاجزاء عدد ساعة منها في النهار الاطول والاقصر يكون متساوية ابداً فطول الملوّنة المستوية يكون بكثرة عدد ساعاتها لا بكثرة اجزاء كل عدد منها وقصرها بقلتها لا بقلة اجزائه واما المعوجة فيقسم اجدى القسيّ المذكورة على اثني عشر ليخرج عدد ساعاتها لاحد الازمنة المذكورة التي يقطع المعدّل في كل ساعة منها طالت او قصرت اجزاء اكثرها ثلث والخارج من القسمة اجزاء من اثني عشر جزءاً من قوس النهار او الليل وطول الملوّنة المعوجة يكون بطول كل من ساعاتها لكثرة اجزائه لا بكثرة عدد هذه الساعات وقصرها بقصره لقلتها لا لقلته وكل ساعتين منها جزء احديهما نهارية والاخرى ليلية مع ساعتين مستويتين متساويتين وكل ساعة معقومة بثلثين جزءاً ينتهي كل منها دقيقة

الفصل الثالث وهو معرفة الشهور والسنين

الشهر هو زمان مفارقة المعدّل عن الشمس وعودها مجتمعان في اية نقطة كانت الى ان يعود اليها ومبدأه من اجتماع النيرين وجعلوا هذا الزمان بان نقص وسط الشمس لليوم من وسط سير المعدّل ليبقى قوس سبق المعدّل ولما كانت

نسبة اليوم الواحد للقوس التي كنسبة الايام المطلوبة لتمر
واحد لان الدور ضرب الاول اعني اليوم الواحد في الدائر اعني
الدور وقسم الحاصل على الثاني اعني التي ليخرج الايام المطلوبة
وهي مابين الاجتماعين ثم ضرب خارج القسمة المطلوب في
اعني عدد ليحصل ايام السنة القمرية وهي اثنا عشر شهرا
واما السنة الشمسية فهي زمان مفارقة الشمس نقطة
كانت وتفرضها اول الحمل للعود اليه المقتضي لعود الاحوال
السنة بحسب فصولها وايام هذه السنة ثلثمائة وخمسة وستون
يوما وكسر واختلف في كمية هذا الكسر فهو على ما رصد اما
ربع من يوم بليلته او خمس عشرة دقيقة واثنان وثلثون
ثانية واربع وعشرون ثالثة او الربع المذكور الا جزءا من
ثلثمائة جزء من يوم او الربع المذكور الا ثلثة اجزاء واربعا و
عشرين دقيقة من ثلثمائة وستين جزءا من يوم وهذه السنة
تزيد على القمرية بعشرة ايام وعشرين ساعة مستوية ونصف
تقريبا

المبحث التاسع في بيان الظل و

استخراج خط نصف النهار ومعرفة القبلة وفيه ثلثة فصول

الفصل الاول في الظل الظل ضوءان وقيل هو عدم

النور المعين عما من شانه ان يستضئ به لو لم يقع مانع وهو قابل
للشدة والضعف وطرفاه المتضادان النور والظلمة وينقسم
الى الظل الاول وهو الخارج عن اصل مقياس منصوب على موازاة
سطح الافق لخط مستقيم موازي لجيب قوس الارتفاع الى غاية ارتفاع
الشمس ويسمى ايضا معكوسا ومنتصبا والى الظل الثاني وهو الخارج
من اصل مقياس منصوب على سطح الافق لخط مستقيم موازي لجيب تمام
قوس الارتفاع ممتدا الى غاية عند طلوع الشمس ثم ينقص
الى غاية ارتفاع ممتد مرة اخرى الى وقت غروبها ويسمى ايضا
مستويا ومبسوطا فعند كون الشمس على الافق يكون بداية
الظل الاول ونهاية الثاني وعند بلوغها الى سمت الراس كان
ذلك بالخلاف واذا بلغ الارتفاع ثمن الدور يصير ظل كل
مقياس اول او ثان مثله وبه ظل كل قوس لا المقياس
مثل نسبة المقياس الى الظل تمام ذلك القوس وظل اول كل
قوس هو ظل ثان لتمامها ويقسم المقياس اما باثني عشر
قسما او بسبعة او بستة ونصف او بستين قسما والاقسام الاول
يسمى اصابع وظله ظل الاصابع والاقسام الثاني اقداما وظله
ظل الاقدام والاقسام الثالث وظله الاجزاء والظل النبوي

واذا بلغ الشمس غاية ارتفاعها ثم يميل الظل من خط نصف النهار
وستعرفه ليلا الشرق بأدنى شئ يكون وقت الظهر واذا
زاد عليه مثل المقياس او مثليه يكون اول العصر الفضل
الثاني في خط نصف النهار يذكر في كيفية استخراجه طريقان
الاول ننصب مقياسا معتدلا كهيئة المخروط على
سطح موزون ثم نأخذ للشمس ارتفاعا عاشر قبليا بآلة صحيحة
ونخط على سمت الظل الواقع للمقياس بخط مستقيم وكذلك
نأخذ ارتفاعا غربيا مثله ونخط على سمت ظله ايضا مثل الخط
الاول فهما ارتفاعان متساويان عن طرفي غاية ارتفاع
الشمس وحينئذ احاط الخطان لا محالة بزاوية عند اصل المقياس
فاذا نصفنا تلك الزاوية بخط مستقيم يكون هو خط نصف
النهار الثاني العمل بالدائرة الهندية وهو بأن ننصب
مقياسا مخروطيا محددا الرأس على مركز دائرة في سطح
مستوغاية التسوية نصبا على زاوية قائمة فيكون عمودا على
سطح تلك الدائرة بحيث يكون هو بقدر نصف قطرها ونرصد
عند دخول ظله الغربي الدائرة موضع وصوله الى محيطها
فنعلم عليه وكذا عند خروج ظله الشرقي عنها ثم نصل بين تلك

العلامتين بخط مستقيم وحينئذ اما ان ننصف ذلك الخط
او القوس الواقعة بين العلامتين ونصل بين نقطة المنتصف
وبين مركز الدائرة ونخرجه الى المحيط فهو خط نصف النهار و
خط الزوال وبه ينتصف الدائرة الى نصفين شرقي وغربي
فمن منتصف ايهما كان نخرج خطا مستقيما ماريا بالمركز عمودا
على الخط الاول الى منتصف النصف الآخر فهو خط الاعتدال
وخط المشرق والمغرب ايضا فتربع الدائرة بهما ثم نقسم
كل ربع منها بتسعين جزأ متساوية
ليظهر بسببها مقادير سمو خطوط
الظل الداخل او الخارج عنده
العلامتين من المحيط وهذه صورتها
واصلح الاوقات لهذا العمل وقت
يكون الشمس في احد الانقلابين او بقربه
والاولى الصيفي وخاصة اذا ارتفعت بقدر معين ولا بقرب
نصف النهار بل على ان يكون بينها وبينه بعد صالح الفصل
الثالث في معرفة سمت القبلة هي نقطة تقاطع الدائرة السمتية
المارة بسمتي رأس اهل مكة ورأس اهل البلد المفروض

مع دايرة افقه والخط الواصل بين تلك النقطة وبين مركز افق
البلد خط سمت القبلة وهو سهم لقوس يبنى عليها اساس المحراب
والخط الذي بين القبلة موتى من الافق بين نصف نهار البلد و
بين حد النقطة المذكورة وهي التي يجب ان تحرف بها المصلي
لمواجهة الكعبة ثم اعلم ان لكل واحد من مكة والبلد طولا و
عرضا لا بد من تحصيلها ليتيسر هذا العمل فاقول لا يخلو
من ان يكونا مختلفين في العرض فقط او في الطول فقط او فيهما
جميعا وعلى التقدير الاول كان مكة والبلد تحت نصف نهار
معين ولا يكون لاحدهما سمت عن الاخر بل سمت قبلة البلد
يكون على خط نصف النهار فان كان عرض البلد شماليا والكثر
من عرض مكة فمواجه المصلي للنقطة الجنوب وان كان شماليا
واقل او جنوبيا فالى نقطة الشمال وعلى التقدير الثاني لا يظن
ان السمت على خط الاعتدال ولا مواجه المصلي نفس مشرق
الاعتدال ولا نفس مغربه لان مكة والبلد يكونان تحت مدار
يومي فيستحيل ذلك ان يمر دايرة اول السموت للبلد بسمت
رؤس اهل مكة بل سمت رؤسهم يكون خارجا عنها وحينئذ ان كان
طول البلد اقل من طول مكة فيحرف المصلي نحو سمت القبلة
من عن

من عن يسار مشرق اعتدال بلده بقدر معين وان كان
الكثر منهن يمين مغرب اعتداله كذلك وعلى التقدير الثالث
فلكيفية استخراجه وجوه الاول وهو ان ننظر بان طول
مكة اما ان يكون اقل من طول البلد او اكثر وكذا عرضها
اقل او اكثر فان كان الاول نعد من اجزاء محيط الدايرة
الهندية مبتدئا بنقطة الجنوب او الشمال بقدر فضل ما
بين الطولين الى جهة المغرب وان كان الثاني فمن ايتهما
كان الى جهة المشرق وان كان الثالث فنبدا بنقطة
المشرق او المغرب من اجزاء محيطها ونعد بقدر فضل
ما بين العرضين الى جهة الجنوب وان كان الرابع فالى
جهة الشمال ثم نصل بين الاجزاء الاربعة المنتهية اليها كل
اثنين في نصف بخطين مستقيمين احدهما الخارج من نهاية
الاجزاء الطولية يوازي خط الزوال والاخر الخارج
من نهاية الاجزاء العرضية يوازي خط الاعتدال فيقاطعان
بالضرورة على نقطة فاذا وصل بين مركز الدايرة
وبينها بخط مستقيم خارج الى المحيط فهو خط
واقع على صوب القبلة وهو المراد وهذه صورته

ففي هذا الشكل قوس آب فضل مابين الطولين وقوس جآ فضل مابين العرضين وقوس طك انحراف القبلة وكه تمامه ونقطة آ مركز الدائرة الهندية قائمة مقام أفق البلد ونقطة ب وهي ملتقى الخطين بالنسبة لا مركز الافق وقد فرضنا صوب مكة حماها الله تعالى الثاني لما كان عرض مكة اقل من الميل الكلي فالشمس لا محالة عند نصف نهارهم تمتد بسمت رؤوسهم وهي في أحد جزئين متساويي الميل والعرض عن جنبتي الاعتدال الصيفي وهما الدرجة الثامنة من الجوزاء والثالثة والعشرون من السرطان واذا عرفتهما فحصل تفاوت مابين نصفي النهارين اعني مابين الطولين ثم ضع احد الجزئين الذي حلت فيه الشمس على وسط سمآ صفحة الاصطرلاب المعمولة للبلد واعلم على المرئي علامة حيث يقع من أجزاء المجرة فان كان البلد شرقيا عن مكة فأدر العنكبوت الى الغرب بقدر التفاوت المذكور وان كان غربيا فالى الشرق فحيث يبلغ الجزء المذكور من مقنطرات الارتفاع فاعتبر مثله بالعدد من أجزاء

الارتفاع

الارتفاع المرسومة على ظهر الاصطرلاب وضع مرئي العضادة عليه وانظر حتى يبلغ الشمس الاثر هذا الارتفاع فيدخل شعاع في ثقبة الهدف العليا وينفذ في ثقبة السفلى فانصب حينئذ مقياسا فحيث يقع سمت الظل فهو جهة القبلة الثالث نترصد بلوغ الشمس احد الجزئين المذكورين فنعرف تفاوت مابين الطولين ونقسمه على خمسة عشر ليخرج عدد ساعات البعد عن نصف نهار البلد فان بقي شئ فاضربه في اربعة ليحصل دقائق تلك الساعات ثم اعتبر ارتفاع الشمس في ذلك اليوم اما ناقصا عن عليتها بقدر الساعات المذكورة اعني قبل بلوغها الى نصف نهار البلد ان كان مكة شرقية عنه أو زايدا على غايتها اعني بعد نصف النهار بذلك القدر ان كانت غربية فحينئذ يكون الشمس على سمت رأس مكة فالظل يقع في سمتها وهو سمت القبلة وحصل المطلوب

المقصد الثالث في بيان

كيفية مقادير الابطال والاجرام ينبغي ان تعلم قبل الشروع فيه ان محيط كل دايرة ثلثة أمثال وسبع قطرها اعني كنسبة اثنين وعشرين الى سبعة وان السطح الحاصل من ضرب نصف القطر

في نصف المحيط مساوٍ لمساحة الدائرة وأن الحاصل من ضرب القطر
في محيط اعظم دائرة الكرة مساوٍ لمساحة السطح المحيط بها وأن
الحاصل من ضرب غاية ميل ما بين نصفي محيطي دائرتين عظيمتين
في قطر الكرة مساوٍ لسطح يحيط بها النصفان وان عظم كل
كرة مساوٍ لجسم يحصل من نصف قطرها في ثلث سطحها فاذا
عرفت قطر كرة عرفت البسيط والعظم المخصوصين بها
ثم اعلم انه اذا قسمت ست شعيرات بحيث يكون بطون
بعضها الى ظهور بعض يحصل منه مقدار ستين اصبعا فاربعة
وعشرون اصبعا هو مقدار ذراع واربعة الاف ذراع مقدار
ميل واحد وكل ثلثة اميال مقدار فرسخ

المبحث الاول

في مساحة الارض وما يلزمها كل دائرة عظيمة
تفرض محيطها على بسيط الارض فهو يكون في سطح دائرة عظيمة
فلكية ولما قسمت الفلكية الى ثلثماية وستين جزءا فكذلك
تقسم به الارضية ايضا والمحققون المهتمون بتحقيق الحقايق
واذراكها لما وجدوا على بسيط الارض بعد التتبع
الى استقراء وامتحان عندهم لهم مقدار درجة واحدة من
محيط العظام الارضية الموازية للعظام الفلكية اثنين و
عشرين

عشرين فرسخا وتسعين ضربوه في الدور وهو ثلثماية وستون
حصل مقدار فراسخ محيط الدائرة العظمى الارضية ثمانية الاف
فنصفه يكون مقدار طول الربع المعمور واذا عرفت مساحة
محيط هذه الدائرة فاقسمه اما على ثلثة وتسع او على اثنين
وعشرين لكن بعد بسط المستوم ليخرج مساحة قطر الارض
الفا وخمسماية وخمسة واربعون فرسخا تقريبا ثم اذا حصلت
مقدار القطر ايضا فاضربه في فراسخ المحيط يحصل الف الف
وثلثماية وستون الف فرسخ مساحة السطح المحيط بالارض
فربعه يكون مساحة الربع المسكون ثم اذا اضرب مقدار درجة
واحدة وهو اثنان وعشرون فيما بين خط الاستواء الى تمام
الميل الكلي وهو ستة وستون جزءا وربع وسدس جزء يحصل
الف واربعماية وستة وسبعون فرسخا مقدار مساحة عرض القدر
المعمور من الارض فاذا اضرب ذلك في مقدار قطر الارض
يحصل مساحته ثلثة الاف الف وسبعماية وسته وخمسون الفا
واربعماية وعشرون فرسخا وهو قريب من سدس جميع مساحة
السطح المحيط بالارض وستة عشره على ما ذكر وبعد معرفة
ذلك ان اردت تحويل هذه الفراسخ الى الاميال فاضرب الطولية

والقدر المعمور ايضا

منها بمقدار فراسخ محيط العظمى او قطر الارض مثلاً في ثلثة مخرج
أميال فرسخ واحد والتكسيرية أعني المساحية مساحة البسيط في
تسعة مربع الثلثة لانها فرسخ في نفسه بل ثلثة في نفسها ليحصل أميال
المقادير ثم ان أردت تحويل الأميال الى الذرعان فاضرب الطولية
في اربعة الآف والتكسيرية في مربعها اعني ستة عشر الفا ليحصل
لك المقادير المذكورة بالذرعان وكذا في تحويلها الى الأصابع فاضربه
الطولية في اربعة وعشرين والتكسيرية في مربعها ليحصل المقادير
بالأصابع طولاً وتكسيراً وكذا في تحويلها الى الشعيرات فاضرب الطولية
في ستة والتكسيرية في مربعها ليحصل شعيرات اصابع المقادير ثم اعلم
ان نسبة جبل يرتفع عن سطح الارض نصف فرسخ الى مجموع قطر
الارض كنسبة خمس وسبع شعيرة الى كرة قطرها ذراع
تقريباً لانه اذا اخذ فراسخ قطر الارض المعلوم آنفاً بعد التضعيف
يحصل خمسة الآف وتسعون فرسخاً فيكون نسبة نصف فرسخ
الى فراسخ قطر الارض كنسبة الواحد الى هذا المجموع لان نسبة
الانصاف نسبة الاضعاف ثم نضعفه على مائة واربعة واربعين
شعيرات وهي اجزاء ذراع ليخرج خمسة وثلثون خمسة شعيرة واحدة
من واحدة منها خمس بقيتها ونسبتها الى شعيرات الذراع كنسبة نصف
الفرسخ

الفرسخ الى نصف مجموع العدد اعني القطر وذلك لان نسبة
الواحد الى المقسوم عليه كنسبة الخارج من القسمة الى المقسوم
وحينئذ يكون نسبة عرض شعيرة الى ذراع كنسبة خمسة و
ثلثين الى خمسة الآف وتسعين فنسبة خمس سبع عرض
شعيرة الى ذراع كنسبة واحد اعني خمس سبع خمسة وثلثين الى
خمسة الآف وتسعين التي هي كنسبة نصف فرسخ الى قطر الارض
فنسبة خمس سبع عرض شعيرة الى جزء من خمسة وثلثين منها
الى ذراع كنسبة نصف فرسخ الى القطر فيلزم منه ان يكون نسبة خمسة
امثال نصف الفرسخ المذكور بالتقريب اعني ارتفاع جبل يكون قدر خمس
وثلث فرسخ الى مجموع قطر الارض كنسبة سبع عرض شعيرة الى
كرة قطرها ذراع وهو المطلوب المذكور في اثبات كروية الارض
في صدر المقصد الاول من الكتاب

الباب الثاني في ذكر كيفية معرفة ابعاد القمر عن مركز الكل

اعلم ان ارباب هذه الصناعة اخذوا نصف قطر الارض
المعلوم مقياساً يقدر به الابعاد كما انهم اخذوا كرة جرم الارض
مقياساً يقدر به الاجرام فيستخرجون ابعاد القمر وغيره من
السيارات عن مركز العالم بذلك المقياس ويعبرون نسبة

بعضها الى بعض بالاضافة اليه وان امكن ان يستخرج تلك
الابعاد بما به نصف قطر المايل او حامل ذلك الكوكب يتبين
لكن هذا الطريق ممنوع عند المجسطي ولم يقدم عليه ونحن
بمعزل عن الصناعة وحيث اطلق المتياس اريد به نصف
قطر الارض وايضا ينبغي ان يعلم ان كل مثلث مستقيم الاضلاع
اذا كان مقدار زاويتين وضلع منه معلوما كانت مقادير
الزاوية الباقية والاضلاع الاخر معلومة لان مقدار الزاوية
كمقدار القوس التي تؤتر الزاوية عند وقوعها على محيط دايرة
او على مركزها فمحيط الدايرة المعمولة على نقطة زاوية مثلث
باي بعد اتفق يكون مؤترا على زوايا فالقوس المنحصرة
منها بين ضلعي المثلث بعد اخراجها او تمثيله هي مقدار تلك الزاوية
واذا صار هذه القوس معلومة يصير الزاوية ايضا معلومة بما به
المحيط ثلثمايه وستون وبعد هذا فاعلم ان بطلميوس
رصد القمر عند اقل ارتفاعاته على نصف النهار وذلك عند
كونه في المنقلب الجنوبي في غاية عرضه عن الممثل واعتبر ارتفاعه
المرئي والحقيقي في الوقت فوجد الاول بالتدقيق كذا
والثاني بالحساب كذا ثم اخذ تفاوت ما بينهما وهو اختلاف
منظر

منظر القمر حينئذ اعني واذا رسم شكل اختلاف المنظر على
السطح يكون صورته هكذا

فيكون مثلث اب ج الذي احد اضلاعه
خارج عن نقطة ج موضع
الناظر والثاني عن نقطة ب
مركز الارض المتقاطعين على
مركز القمر عند نقطة ا والثالث
نصف قطر الارض المعلوم ونفرضه واحدا ولما كان زاوية
ا بينه وبين بقدر تفاوت ما بين ارتفاعين وزاوية
وبين تمام الارتفاع معلومتين يصير مقدار الزاوية الثالثة اعني
زاوية اج معلومة لانها تمام مجموعهما بقائمتين اذ مقدار كل
قائمة مستديرة تسعون فاثنتان منها تكون مائة وثمانين
فاذا نقص عنها مقداري الزاويتين الاولين يبقى مقدار الثالثة
فكذا وحينئذ اذا صار الضلع الثلث الذي هي مقادير زوايا
المثلث معلومة صارت جيوب تلك الاضلاع وهي جيوب الزوايا
ايضا مجازا معلومة بالضرورة من جداولها ونسب اضلاع
المثلث بعضها الى بعض كنسب جيوب الزوايا التي تؤترها

تلك الاضلاع على التناظر كما تبين في الهندسة مثلاً في المثلث
المذكور بنسبة ضلع آب الاضلع ب ح كنسبة جيب زاوية ج آ
الى جيب زاوية آ فهذه اربعة اعداد متناسبة فاقسم مضروب
الوسطين على الرابع ليخرج مقدار الضلع المجهول وهو ضلع آ ب
اعني بعد القمر عن مركز الارض بستة وثلثين جزءا ونصف وربع
جزء بالمقياس وهو المراد ولما كان بالطريق المذكور في المجسطي
ضلع آ ب وهو بعد القمر المذكور بابه نصف قطر فلك مايله
ستون ونصف قطر تدويره خمسة وزيد وما بين المركزين
عشرة اجزاء وتسع عشرة دقيقة وقت رصده القمر اربعين
جزءا وربع وسدس جزء وقد قدر بعد القمر بالمقياسين اعني بابه نصف
المايل ستون وبابه نصف قطر الارض واحد وقدر المقادير
الاخر المذكورة بالمقياس الاول فقط فحوجنا ايضا الى التقدير
بالمقياس الثاني لانه اذا علم مقدار واحد لمقياسين امكن ان
نحول كل ما يقدر بواحد من ذينك المقياسين الى الآخر لكون
جميع ما يقدر بكل واحد منهما على نسبة المقياسين وذلك
باستعانة الاربعة المتناسبة مثلا نقول في تحويل نصف قطر
المايل الى المقياس نسبة وسمي نسبة الستين الى المقدار المجهول

أو الى مركز كنسبة مركز او المقدار المجهول الى الطامة ثم نضرب
الاول في الرابع ونقسم المضروب على احد الوسطين اما على الثالث
او على الثاني ليحصل الثاني او الثالث اعني نصف القطر بالمقياس و
هو ستون وخمسون جزءا وكذلك نقول في تحويل نصف قطر التدوير
نسبة ه ك الى م ك كنسبة المجهول الى الطامة وفي تحويل ما بين
المركزين نسبة ن ط الى م ك كنسبة المجهول الى الطامة ليخرج
من الاول بعد تمام العمل بالمقياس ه ي ومن الثاني ن ط و
اذا انقصناه اعني ما بين المركزين عن نصف قطر المايل وهو
ستون وخمسون جزءا بقي نصف قطر الخارج المركز مح نا
فظهر ان البعد الابعد للقمر عن مركز العالم بالمقياس هو
مجموع نصف قطر المايل ونصف قطر التدوير او نصف قطر
التدوير ونصف قطر الخارج المركز وما بين المركزين
ومقداره سدس ي وبعد نقصان نصف ما بين المركزين
وقطر التدوير عنه يبقى بعده الاقرب الى آ ك واما
بعده الاوسط بالمقياس بحسب المسافة فهو بقدر نصف
قطر الخارج المركز وقد عرفت مقداره واذا عرفت
مقادير ابعاده وابعاد غيره كما سيجيء بالمقياس واردت

معرفتها بالفراسخ أو غيرها فعليك بالعمل كما عرفت

المبحث الثالث في معرفة مقادير

قطري النيرين وحجميهما والظل وبيان أبعاد الشمس والظل عن مركز الأرض إستشرح بطلميوس هذه المطالب بمقدمة تشتمل ما بين عرض القمر من خسوفه في الذروة مرتين وهو سبع دقائق ونصف وثلث دقيقة لأنه إذا خسف أول الأوج فقطره وعرضه حينئذ كان بالحساب ثمانية وأربعين دقيقة ونصفا وإذا خسف ثانيا نصفه فعرضه أربعين دقيقة وثلثي دقيقة فبالضرورة يكون التفاوت بقدر ربع قطره فاستدل بذلك على أن قطر القمر في بعده الأبعد أعني الاستقبال يكون أربعة أمثال التفاوت ومجموعها واحد وثلثون دقيقة وثلث دقيقة وعلى أن عرضه في الخسوف الثاني يكون بقدر نصف قطر الظل لكون مخروط دائرة الظل مماسا لمركز صفحة القمر وهذا القدر يكون ضعف قطر القمر مع زيادة يسيرة لأنه إذا خسف

إذا بانبعاد الأجسام ينقص العرض

تقريبا وهذه النسبة واقعة بينهما في جميع الأبعاد ثم حكم أيضا بأن قطر الشمس وهي في بعدها الأوسط مثل قطر القمر وهو في بعده الأبعد وإن كانا متساويين في النظر

لأوجدها بطلميوس في خسوفات كثيرة وأبعاد مختلفة

فيما كثر الأوضاع ووضع لبيان المطالب على السطح المار بمراكز النيرين والأرض وبسهمي مخروطي الظل والقمر صورتها هكذا ليعرف بسببها بعد مركز الشمس وهي في بعدها الأوسط وبعد راس مخروط ظل الأرض كليهما عن مركز الأرض وبعد الراس أيضا عن مركز دائرة الظل وهي عند البعد الأبعد للقمر فاسه في الشكل الموضوع الفصل المشترك بين السطح المذكور وبين مخروطي الشمس والأرض وانه الفصل بينه وبين مخروطي الشمس والقمر وابه حول نقطة ه دائرة عظيمة مارة بمركز الشمس وهو وبح حول ط مارة بالقمر وهو في بعده الأبعد أعني عند الاجتماع وكل من حول نه مارة بالأرض وقع قطر دائرة الظل في الجهة الأخرى عن الأرض على بعدينا ولأبعد بعد القمر أعني عند الاستقبال فمقدار بعد كل من مركز الظل ومركز القمر عن مركز الأرض يكون أربعة وستين وسدسا في مثلث طانح الواقع في مخروط ظل القمر بين مركزي الأرض

والقمر زاوية نه التي عند مركز الارض وربع ترطا يضف
قطر القمر ومقداره ٣٠ م وزاوية ط عند مركز القمر وهي
هي قائمة تكون معلومتان فبقين زاوية ح ومقدارها
فط مدك الى تمام قائمتين معلومة ولما عرفت ان نسبة اضلاع
المثلث كنسبة جيوب الزوايا فنسبة طح نصف قطر القمر
المجهول بالمقياس الى ضلع نه ط ومقداره سدس وهو بعد
مركز القمر عن مركز الارض كنسبة جيب زاوية نه التي عند
مركز الارض وهي ست عشرة دقيقة وخمس دقيقة الى جيب
تمامها اعني ستين جزءا تقريبا وعلمت ان ضلع نه ط المذكور
بما به نصف قطر الارض واحد يكون سدس قطر الارض
المتناسبة نسبة سدس الى المجهول كنسبة الواحد اعني المقياس
الى يوكد يبتسم مضروب الاول في الرابع على الثاني ليخرج مقدار
نصف قطر القمر المجهول بالمقياس سبع عشرة دقيقة وثلثا
وثلثين ثانية واذا ضوعف هذا المقدار وزيد عليه ثلثة
اخماسه يحصل خمسة واربعون دقيقة وثمان وثلثين ثانية
وهي مقدار نصف قطر الظل بالمقياس واذا كان بعد ما بين
مركزي القمر والظل وهو خط طف ضعف ما بين مركزي

القمر والارض وهو خط ط نه يكون مجموع ف قه نصف
قطر الظل وط آ نصف قطر محروط الظل عند القمر ضعف
نه م نصف قطر الارض ولتوضيحه نخرج من نقطة قه خطا
متوازيا لخط ف نه ط لا نقطة ح فما بينهما من الخطوط الثلثة
اعني قه آ قه ه نه ضه طح متساوية فمجموع الاول والاخير
منها يكون ضعف الثالث وبقي ح آ ايضا ضعف ضه م لانهما
بالشكل الثاني من سادسة الاصول على نسبة قه ح قه ضه
والواو ثبت انهما ضعف نصف قطر الارض فليظهر تساويهما لتمام
قطريهما اثنان بالفرض فاذا نقص عنهما مجموع نصفي قطري القمر
والظل المعلومين المذكورين اعني جزءا واحدا وثلث دقائق
واحد عشرة ثانية يبقى ست وخمسون دقيقة وتسع واربعون
ثانية وهي مقدار خط ح آ الباقي من الاثنين فاذن لنسبة
نه م نصف قطر الارض الى هذا المقدار كنسبة ضلع نح الى
ضلع نه ح المتناسبة مثلثي ح م نه ح ح آ اعني كنسبة البعد الاوسط
للشمس عن مركز الارض وهو خط نه آ الى البعدين البينين
اعني ط آ وحينئذ اذا فرضنا نه آ البعد الاوسط للشمس
واحدا يكون نسبته الى البعد ما بين البينين اعني ط آ كنسبة

شبكة الألوكة
www.alukah.net

واحد تام الا ست وخمسين دقيقة وتسع واربعين ثانية ويبقى
لهذه الدقايق الى واحد صحيح ثلث دقايق واحد عشرة ثانية فهذا
الباقى يكون مقدار خط طا اعنى ابعد البعد العمر عن الارض
ولما عرفت انه بالمقياس اربعة وستون وستة اسداس مقول بالابعد
المتناسبة اذا كان خط طا مقداره ٦٤ ما بين الواحد لخط
طآ ما بين مركزى النيرين يكون ٦٤ نو وسط بينه فلو كان ذلك
بالمقياس سدسى فلكم يكون هذا ثم نعمل بها ليحصل من خارج قسمة
مضروب الوسطين على الاول بعد انضمام سدسى اليه الف وخمسمايه
وعشرة امثال المقياس وهذا مقدار البعد الاوسط للشمس عن
مركز الارض واما بعد راس المخروط ظل الارض فمقول
ايضا اذا ثبت انه مثلثا سه م نه سه ف قه فنسبة نه م المقياس
الى ف قه نصف قطر الظل المعلوم قدره كنسبة نه سه بعد راس
المخروط عن مركز الارض الى ف سه بعده ايضا لكن عن مركز
دايرة الظل فاذا فرضنا نه سه بعد الراس عن الارض واحدا
لزم ان يكون ف سه بعده عن مركز الظل ٦٤ مه ح وذلك
بسبب النسبة المذكورة فيبقى بمقدار نه ف اعنى ما بين مركزى
الظل والارض ٦٣ مكتب من الواحد وهو بالمقياس
سدسى

سدسى اذ فرضناه فى البعد الابعد للشمس فى الجهة المقابلة
له وحينئذ فاعلم بالاربعة المتناسبة وهى هذه اذا كان قدر
نف ٦٣ يكون قدر نف ٦٤ مه ح فلو كان نف بالمقياس
سدسى فلكم يكون فسره ليخرج بعد العمر ما يتان وثلثة امثال
المقياس ونصفه وثلثه بعد راس المخروط عن مركز الظل واذا
زيد عليه سدسى مقدار نف بالمقياس يحصل بعده عن مركز
الارض مايتان وثمانية وستون مثلا للمقياس واما
وقوفه مقدار جزميهما وجرم الارض فقد ثبت فى قول علم
المناظر ان كل جرم يرى مساويا لجرم آخر مختلف البعد
فان نسبة مقدار قطر الاقرب منهما الى مقدار قطر الابعد
كنسبة بعد مركز جرم الاقرب الى بعد مركز جرم الابعد لاحاطة
خطين شعاعيين بهما وحدوث مثلثين متشابهين على
هذه الصورة فلهذا لما كان نسبة مقدار نصف قطر
القمر وهو سر ك الا نصف قطر الشمس المجهول كنسبة
سدسى ابعد بعد القمر الى غرة اوسط بعد الشمس يكون
خارج قسمة مضروب الطرفين على الثالث وهو خمسة
ونصف بالمقياس نصف قطر الشمس المطلوب ثم اذا



أردت بيان نسب المقادير الثلثة اعني أجرام كرات المشرب
والأرض بعضها الى بعض فاعرف أولا نسبة قطر الشمس وقطر
الارض بما به قطر القمر واحد بواسطة الاربعة المتناسبة وهي هذه
لما كان قطر القمر ه له و كان قطر الارض ب ه وقطر الشمس
يا آ فلو كان قطر القمر واحدا لكم يكون كل واحد من هذين
النسبتين فاقسم مضروب ه آ بعد البسط في الواحد على
له و ومضروب ب يا آ بعد فيه عليه ايضا يخرج بالعمل
الاول ثلثة وخمسان مقدار قطر الارض وبالثاني ثمانية عشر
واربعة اخماس مقدار قطر الشمس واذا عرفت هذا فاطلب
مقادير هذه الاقطار الثلثة واعرف نسب بعض المكعبات
الى بعض فان كنسبة عظم كرة منها الى كرة اخرى لما بين
او مليدس في الشكل الاخير من المقالة الثانية عشر من الاصول
لتعلم ان كرة الشمس اعظم من كرة الارض بماية وستة وستين مرة
وربع وثمن على تقدير كون مجموع قطر الارض واحدا وكون
قطر الشمس خمسة ونصفا ومن كرة القمر بستة آلاف وستماية
واربعة واربعين على ان يكون قطر القمر واحدا وقطر الشمس
ثمانية عشر واربعة اخماس وان كرة الارض اعظم من كرة
القمر بتسعة

وتسعين مرة وربع على تقدير كون قطر القمر واحدا
وقطر الارض ثلثة وخمسي واحد

المبحث الرابع

وفيما بقي من ابعاد الشمس وذكر ابعاد السفليين وبيان
مقدار نسبة جزئيها من الارض لما كان مقدار ما بين مركزي
فلكي الشمس عند بطلميوس جزئين ونصفا بما به نصف قطر فلكها
الخارج المركز يل بعدها الاوسط ستون فهو يكون ربع سدس
ستين اعني جزءا من اربعة وعشرين من بعد الشمس الاوسط
وقد عرفت المقدار به بالمقياس عشرة فبالاربعة المتناسبة نسبة
المجهول كنسبة اربعة وعشرين لا الواحد او نقول نسبة اثنين
ونصف لاستين كنسبة المجهول لا الف ومايتين وعشرة فبعد
العمل بانهما كان يخرج خمسون جزءا وكسر وهو قدر ما بين
المركزين بالمقياس فاذا زيد هذا على بعدها الاوسط المعلوم
بلغ بعدها الابعد الا الف ومايتين وستين مثلا للمقياس
قربها واذا انتقص عنه بقي بعدها الاقرب الفا ومايتين وستين مثلا
له ولثماني متغير كل فلك مجذب الآخر بحيث لا يخلله ثالث يلزم
ان يكون مقدار البعد الابعد لكل كوكب سوى البعد الاقرب للذي
فوقه بالفلك كالبعد بعد الشمس فانه اقرب بعدا المريخ وافقدها

زهما مذ الاصول الماخوذة عن
المجسطي وبعد ذلك يستعان
بها على ادراك مقادير سائر
الابعاد واجرام

شبكة الألوكة
www.alukah.net

أبعد الزهرة وستعرفها ولما تقدر بالطريق المذكور في المجسطي
ان مقدار ما بين مركزي فلكي الزهرة جزء وربع ومقدار نصف قطر
تدويرها مائة واربعون وستة بما به نصف قطر حاملها ستون فاذا
زدتها عليه اعني على ستين يحصل مقدار بعدها الابعد به مائة واربعة
اجزاء وربع وستة اجزاء واذا نقصتها عنه يبقى مقدار بعدها الاقرب
خمسة عشر جزءا وثلث وربع جزء فحصلت نسبة مقدار الاقرب الى الابعد
بالعشر ونصف العشر ثم ناخذ بتلك النسبة بعينها من بعدها الابعد بل
اقرب الشمس بالمقياس ليحصل اقرب بعد الزهرة مائة واربعة وستون مثلا
للمقياس فهو ابعد بعد عطارد واوسط بعدها يكون نصف مجموع بعديها
الابعد والاقرب وهو سبعة واربعة وستون مثلا له واذا عرفت
ان بعد واحد من مخروطي ظل الارض عن مركزها مائتان وثلثة امثال
المقياس وكسر فلذلك قيل انه يتعدم فيما بين بعدي فلكيها الاقرب و
الاوسط ثم بزيادة ما بين المركزين ونصف قطر التدوير على نصف
قطر الحامل لكل كوكب ونقصانه حسبه يستخرج بعد الابعد والاقرب
ما خلا عطارد وبالطريق المذكور ايضا تعرف ان ما بين كل مركز
من مراكز افلاك عطارد وبين الذي يليه ثلثة اجزاء فالمجموع يكون
تسعة وان نصف قطر تدوير اثنان وعشرون جزءا ونصف كل واحد

فان اردت ان تعمل بالمناسبة من ظهوره
فنسبة نقص ابعد الزهرة الى
المجهول اعني اقربها بالمقياس ايضا
كنسبة قدر كل ابعدها ايضا الى
نصف قطر الحامل الى ما له
اقربها بنصف قطر الحامل

بمائة ونصف قطر حامله ستون فاذا جمعتها معه يحصل بعده الابعد به
احد وستون جزءا ونصف واذا لم يكن بعده الاقرب مقابلا
لبعده الابعد لم يمكن ان يستخرج بنقصانها من ستين نصف قطر
حامله بل بالاستقراء عرف ان بعده الاقرب مائة وثلثون جزءا
وربع وثلث وربع جزء ثم نسب هذا المقدار الى بعده الابعد كان خمسا
وسدسا منه وكان ايضا نسبة ابعد بعد اعني اقرب الزهرة الى
ابعد بعديها بالاقرب الشمس بالعشر ونصفه فيكون بنسبة هذا المقدار
كنسبة احد عشر جزءا من ثلثين من مائتين اعني جزءا من ثمانية
عشر ولما قعد بنسبة ابعد القمر من اقرب الشمس المذكورين
قريبا من هذه النسبة فغلبة الظن حكموا ان فلكي الثفلين بين
النيرين ليلا يتعطل بعد ما بينهما ثم اخذ من ابعد بعد عطارد
بالنسبة المذكورة خمسة وسدسه بلغ اربعة وستين مثلا للمقياس
وهو اقرب بعد عطارد وان ابعد القمر المستخرج بالحساب
من قبل واما بعد الاوسط اعني نصف مجموع بعديه فهو مائة
وتسعة عشر مثلا للمقياس وهذا مطرد في تحصيل البعد الاوسط
لكل كوكب ولان تفاوت ما بين بعدي الابعد والاقرب لفلك
كل كوكب يساوي تخنه فتخن فلك الزهرة تسعة وستة وثمانون

شبكة الألوكة
www.alukah.net

مثلا للمقياس وتخت فلك عطارد بما فوقه اعني ضعف ابعد بعده
المذكور وهو ثلثمائة وثمانية واربعون مثلا له واما تخته اعني
جشو ما بين سطحيه فقط فهو مايه وعشرة بالمقياس واذا عرفت
هذا فاعلم ان ارباب الصناعة ذكروا في بيان جهة جرم السفلين
اما الزهرة فقيل ان قطرها في بعدها الاوسط يكون كجزء قطر
الشمس منه تقريبا فنأخذ معتادا بعدها الاوسط اعني خمسة فنسبتها
الى عشرة اوسط الشمس كنسبة قطر الزهرة الى قطر الشمس لان
قطرها يوتر جزءا من عشرة من قطرها ووضع صور الكواكب والشمس
في الابعاد يكون هكذا وذلك لان نسبة بعد الكواكب كا ح
كيف كان وضعه عن مركز العالم الى بعد الشمس كنسبة ح ط قطر
الكوكب المجهول الى به اعني قدر كيسترة الكوكب من قطرها المسمى
بجصة الكوكب لتشابه مثلثي اح ط اب ه لاشتراك زاويتي
ا بينهما وتوازن قاعدتي ح ط ب ه فاذا ضرب الاول في
الرابع وقسم الحاصل على الثاني يخرج قدر القطر المجهول للزهرة
من عشر قطر الشمس كواحد من عشر وواحد وثلث واربعين
جزءا تقريبا ثم نضربه مع الدقايق اعني عشر قطر الشمس في عشرة
يحصل ثمانية عشر وسدسا فنسبة قطر الزهرة اليه يكون
كنسبة واحد من ثمانية عشر جزءا وسدس وحينئذ لما كان
نصف قطر الشمس خمسة ونصفا بالمقياس فتمام قطر الارض
من تمام قطرها يكون كجزئين من احد عشر ايضا فنأخذ من
ثمانية عشر وسدس جزآن من احد عشر اما بان نضرب ح ح في
ب ه ونقسم الحاصل على ا ح او بان نقول لما علم ان قطر الشمس ح ح
بما به قطر الزهرة واحد وقد علم ايضا انه بالمقياس يا فنسبة
ح ح الى المجهول كنسبة يا قطر الشمس الى قطر الارض فنعمد
العمل بايهما كان يخرج قطر الارض المجهول بما به قطر الزهرة واحد
ثلثة اجزاء وثلثة اعشار جزء فظهر ان قطر الزهرة من قطر
الارض كواحد من هذا العدد الخارج ثم نكعبها ليبلغ مكعب الثلثة
والثلثة الاعشار الى ستة وثلثين تقديبا فنعرف ان كرة الارض
ستة وثلثون مثلا لكرة جرم الزهرة بالتقريب واما عطارد
فقيل ان قطره في بعده الاوسط من قطر الشمس كواحد من خمسة
عشر لانه يستر جزءا من خمسة عشر من قطرها فنسبة مقدار
بعده الاوسط اعني قيط الى اوسط الشمس كنسبة القطر المجهول
لعطارد الى جزء من خمسة عشر من قطرها لما مر في الشكل
السابق فهو كواحد من خمسة عشر بل هو ثلث الخمس فاوسط

بعده ايضا يكون من اوسط الثمن كواحد من عشرة اجزاء وسدس
الى ثلث خمس قطر الثمن بالتقريب فهذا العدد قطره من ثلث
خمس قطرها فاذا ضربنا العشرة والسدس في خمسة عشر
مخرج ثلث الخمس يحصل مايتان وثلثة وخمسون تقريبا وهو قطر الثمن
بما به قطر عطارد واحد فقدر قطره من قطرها يكون كواحد
منها ثم نأخذ منها جزئين من احد عشر اعني قطر الارض من
قطر الثمن لما مر في الزهرة لكن ههنا قطر الثمن بما به قطر عطارد
فح فنسبة اثنين الى احد عشر كنسبة المجهول الى فح فبعد قسمة
مضروب الاول في الرابع على الثاني يخرج ما به وحدون
تقريبا فقدر قطر الارض بما به قطر عطارد واحد فقدر قطره
من قطرها كجزء منها ثم نكعبهما ليبلغ مكعب ثمانية وعشرين
الى احد وعشرين الفا وتسعماية واثنين وخمسين فكرة جرم الارض
يكون اثنين وعشرين مرة مثل كرة جرم عطارد وهو اعلم بالحقائق

المبحث الخامس في بيان ابعاد الكواكب

العلوية ومعرفة اجرامها اعلم انه ثبت بالطريق المذكور في المجسطي
قدر ما بين مركزي كل من هذه الكواكب وقد انصاف اقطار
تداويرها كل بما به نصف قطر حامل ذلك الكوكب ستون

فالاول للمريخ ستة اجزاء والثاني تسع وثلثون جزءا ونصف
والاول للمشتري جزآن ونصف وربع جزء والثاني احد عشر جزءا
ونصف والاول لزحل ثلثة اجزاء وربع وسدس جزء والثاني
ستة اجزاء ونصف وبعد زيادة ما بين المركزين ونصف
قطر التدوير على نصف قطر الحامل لذلك الكوكب ونقصانها
عنه يحصل البعد الابعد للكوكب والبعد الاقرب له اما المريخ
فبلغ بعده الابعد بعد زيادتها الى مايتين وخمسة اجزاء ونصف
وبقي بعده الاقرب بعد نقصانها عنه اربعة عشر ونصفا فهذا
من الاول للواحد من سبعة تقريبا وهي الخارج من قسمة
الابعد على الاقرب فمضروب اقرب بعده بل ابعد الشمس بالمقياس
في السبعة وهو ثمانية الاف وثمانماية فعشرون مثلا للمقياس
ابعد بعد المريخ واوسط بعده اعني نصف مجموعهما بالمقياس
خمسة الاف واربعون مثلا له فهي اربع امثال اوسط الشمس
وسدس مثل ولما وجدوا قطر المريخ في بعد الاوسط
لجزء من عشرين جزءا من قطر الشمس اعني لنصف عشر
قطرها فهي بعينه كنسبة اوسط الشمس وفرضناه واحدا
الى الاربعة والتسع اوسط المريخ المذكور بما عرفت

شبكة الألوكة
www.alukah.net

في الشكل السابق لكن بنصف عشر قطر الشمس على أن جميع قطرها
خمسة ونصف بالمقياس يكون ستة عشر دقيقة ونصفاً
فنسبتها لا قطر المريخ المجهول قدره بالمقياس كنسبة الواحد
لا أربعة وستين فخارج قسمة مضروب الطرفين على
الواحد يكون هو بعينه مقدار قطر المريخ بالمقياس وهو واحد
وتسع دقايق ولان نسبة تمام قطر الارض لا قطر المريخ
كنسبة مكعبيهما فاذا كعبناها يظهر أن جرم المريخ يكون مثل جرم
الارض مرة ونصفاً تقريباً ولان قطر مثل الشمس بالمقياس
بعدها الابعد اذا كان اثنين وخمسين وعشرين بالمقياس
فثخن فلك المريخ بل قطر تدويره اعني فضل ابعد على
اقربه وهو سبعة الاف وخمسمائة وستون مثلاً له يكون
ثلثة امثال ثخن فلكها بما فيه من الافلاك والعناصر ومنه
ظهر بيان ما قيل انه اذا احترق المريخ في ذروة تدويره
يكون البعد بينه وبين الشمس اعظم بكثير مما بينهما وهو في حضيضه
واما المشتري فيبلغ بعد الابعد له اربعة وستين جزءاً
وربع جزء ويبقى بعد نقصانها عنه بعد الاقرب خمسة و
اربعون جزءاً ونصف وربع وهذا المقدار اذا زيد عليه

بعده واضعه وسدسه يصير مثل العدد الاول فاخذ من
مقدار البعد الاقرب للمشتري بالمقياس اعني ابعد المريخ مقادير
الاجزاء الثلثة وجمعها ثم نزيده على الماخوذ عنه ايضاً يحصل
ابعد المشتري بالمقياس اربعة عشر الفاً ومايتان وتسعة و
ستون مثلاً له نصف مجموع بعدي المذكورين يكون بعد
الاوسط وهو واحد عشر الفاً وخمسمايه واربعون مثلاً للمقياس
تقريباً وهو تسع مرات مثل بعد الشمس الاوسط وثلث وخمس
مرة وقد وجد قطر جرم المشتري في بعده الاوسط من قطر
الشمس مثل نصف سدس قطرها في بعدها الاوسط فالكل
الثاني يكون نسبة قطره الاجزاء مئتين وعشرين من قطرها
كنسبة اوسط بعد الى اوسط بعدها بل كنسبة تسعة وثلث و
خمس الى الواحد فاذا اخذ من خمسة ونصف اعني قطر الشمس
نصف سدسه يحصل سبعة وعشرون دقيقة ونصف ثم ضرب
فيها تسعة وثلث وخمس يحصل اربعة وخمسين وسدس مقدار
قطر المشتري فواضحها يكون لقطر الارض من قطر المشتري
وبعد تكعيبهما يعرف ان جرم المشتري لجرم الارض اثنان
وثمانون مرة وربع مرة واما زحل فيبلغ بعد الابعد

بعد الزيادة الا تسعة وستين جزاء وثلثي جزء وربعه وبعد النقصان
يبقى بعده الاقرب خمسين جزاء ونصف وستين جزء فاذا تضاعفا
على الاقرب حصلا بصير مثل الابعد وهو يكون مجموع الاقرب ومثليه
وحينئذ اذا ضرب اقرب بعد زحل الى ابعد المستقر في واحد وخمسين
يحصل ابعد بعد زحل تسعة عشر الفا وستمائة وثلثة وستون مثلا
للمقياس فبعد الاوسط يكون تسعة عشر الفا ومائة واحد وعشرين مثلا
له وهذا يكون عشرة امثال البعد الاوسط للشمس تقريبا ولما وجدنا
قطر جرم زحل في بعده الاوسط من قطر الشمس وهو كواحد من ثمانية عشر
مثلا لكل السابق يكون نسبة قطره لاجزء من ثمانية عشر من قطرها
كنسبة بعد زحل الاوسط الى اوسط الشمس اي كنسبة اربعة عشر الى
الواحد تقريبا ثم نأخذ جزءا من ثمانية عشر من قطرها على انه قط
خمسة ونصف يحصل ثماني عشرة دقيقة وثلث ونعمل بالمناسبة
بان جزءا من ثمانية عشر من قطرها اذا كان واحدا يكون قطر
زحل اربعة عشر فاذا كان ذلك الجزء ثمانية عشر وثلثا كم يكون
قطره نضرب اربعة عشر في ثمانية عشر وثلث بعد قسمة يخرج
اربعة وربع تقريبا مقدار قطر زحل فيكون قطر الارض منها
لجزء واحد من جزء وربع جزء تقريبا وبعد تكعيبها يعرف ان جرم

زحل

زحل يكون مثل الارض سبعا وسبعين مرة تقريبا

المبحث السادس

في ذكر ابعاد الثوابت وكمية احجامها اعلم ان هذه الآلات
لما لم يحتاجوا في اثبات الاجرام السماوية الى المباعدة عني لم يثبتوه بناء
على انه لا معطل في الوجود ولا مفضل ثمة غير محتاج اليه وان كان
ذا فعال غير معلوم لهم فلذلك جعلوا بعد الكواكب الثابتة
من الارض مثل ابعد بعد زحل ولما وجدوا ان نسبة قطر جرم
كوكب منها يكون من اوسط كواكب العظم الاول الى جزء من
عشرين من قطر الشمس بل الا ست عشرة دقيقة ونصف فانها
تنقص عن خمسة عشر ونصف كنسبة ابعد زحل الى بعد الكوكب المذكور
الى اوسط الشمس اعني كنسبة ست عشرة ونصف ايضا الى الواحد
فمن مضروب الوسطين وهو الخارج بعينه من قسمته على الرابع
يحصل اربعة وثلث وخمس واحد بابه قطر الارض واحد فهي
مقدار قطر الكوكب المذكور فيكون قطره كقطر الارض اربع
مرات وثلث وخمس مرة واذا كعبت مي يعرف ان جرمه
ثلث وتسعون مرة مثل جرم كرة الارض تقريبا ثم اذا
قسمت هذا المقدار على ستة واردت ان تعرف مقدار
جرم الكوكب الواقع في اوسط العظم الثاني فانقص خارج القسمة

شبكة الألوكة
www.alukah.net

أعنى السدس عن مقدار جرم الكوكب الذى عرفت مساحته
من أوسط العظم الأول ليكون الباقى مقدار المطلوب ثم انقص
سدس هذا المقدار المعلوم عن نفسه ليكون الباقى مقدارا ما
فى أوسط العظم الثالث وهكذا الى أن تصل الى الكوكب الواقع
فى العظم الثانى فهو يكون سدس ما فى أوسط العظم الأول الذى
عرفته لتبينهم المرصودة على تفاضل السدس بينها كما مر ذكره
واذا قسمت السدس المذكور على ثلثه وتجعل الخارج أعنى ثلث
السدس تفاضلا بين اكبر كوكب كل قدر فى كل مرتبة وبين
أوسطه فيهما بينه وبين أصغره فيها ينبغى أن تنقص أوسط
كل قدر عن اكبره بثلث السدس وأصغره عن أوسطه بذلك
القدر أيضا فاذا أخذنا ثلث السدس أعنى خمسة وسدسا من
خمسة عشر ونصف من ثلثه وتسعين اى من المكعب أوسط كوكب من
كواكب العظم الأول المذكور وزدناه على المكعب أيضا يحصل
مقدار جرم اكبر الثوابت وهو ثمانية وتسعون مرة وسدس
مرة مثل الأرض واذا نقصناه اى خمسة وسدسا من خمسة عش
ر ونصف مقدار أوسط كواكب العظم الثانى يبقى مقدار جرم
أصغر الثوابت وهو عشرة وثلث مرة مثل جرم الأرض

المستخرج منه

فهو المطلوب يكون من اكبر القدر الأول

التى نسبتها الى ما فى اوسط العظم الأول نسبة ثلث السدس

وهكذا بجميع الأقدار ومراتبها فبهذا الطريق المذكور
يظهر ان اعظم هذه الأجرام بما به كرة الأرض واحد الشمس ثم
الكواكب الثابتة من العظم الأول مطلقا ثم اكبر القدر الثانى ثم
المشترى ثم أوسط القدر الثانى ثم زحل ثم باقى الثوابت ثم المريخ
ثم الأرض ثم الزهرة ثم القمر ثم عطارد فهو اصغر الكواكب المرصودة
واذا عرفت الأبعاد المذكورة بالمقياس اعنى بما به نصف قطر
الأرض واحد وأردت معرفتها بالمقاييس الأخر فحولها اليها
كما مر فى ضبط هذا المقصد مثلا أقرب بعد المريخ عن
مركز الأرض وهو لج بالمقياس اذا ضرب فى مراسخ نصف
قطر الأرض وهو ألف ومائتان وثلثة وسبعون فرسخا تقريبا
يحصل مقدار نصف قطر عالم الكون والفساد اثنان واربعون
الفا وسبعمائة وتسعة مراسخ واذا نقص عن هذا المقدار اعداد
نصف قطر الأرض يبقى احد واربعون الفا وأربعمائة وستة وثلثون
فرسخا وهو مقدار البعد عن السطح المحيط بالأرض الى المقعر فلك
القمر وكذلك نعمل مثلا فى تحويل ابعاد الأبعاد المعلومة للبشر اعنى
ابعد بعد الثوابت عن مركز الكل بان نضرب بعد الثوابت بل أبعد
زحل فى مراسخ نصف قطر الأرض يظهر عليك أن مقداره بالفراسخ

خمسة وعشرون ألف ألف وأربعمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وستة وستون وحينئذ من ضرب هذه الفرائح في ثلثة يحصل أمثال هذه الأبعاد ثم من ضرب الأمثال في أربعة آلاف يحصل ذرعانها ثم من ضربها في أربعة وعشرين يحصل أصابعها ثم من ضربها في ستة يحصل مقادير شعيراتها وقس عليه ما سواه وبالله التوفيق وإليه سواء الطريق

تل نيب

ولكن عند هذا أحرى الكتاب المجموع فيه بعض من فوائد ذوي الألباب والله خبير بحقيق الحقائق ولطيف بدقيق الدقائق فهو عالم الغيب والشهادة والراسخون في العلم سجود له قائلون بالعجز والقصور فليعترف من سواهم وهم نواقص عاجزون محجوبون وفي غمرات بحر الطبيعة بقوام الإنسية مغمورون أن أكثر هذا الفن لعلمائنا الكرام وخصوصا أشرفه وهو معرفة الأجرام والأجرام أرفع شانا وأعلق بيانا من أن يحيط به القوة البشرية والمشاعر الحسية بل الحيوانية الدنية البدنية ويؤيده اعتراف الحكماء المحققين والأساتذة الأقدمين المتبحرين بانه لم يتبين لهم أن كل واحدة من كرة الثوابت والكرة التي تصدر عنها الحركة اليومية أيضا هل هي كرة واحدة

او كرات كثيرة بعضها فوق بعض ويحتمل أن يكون كل منهما كرات كثيرة مختلفة في مقادير حركاتها بمقادير قليل جدا بحيث لا يدرك في كل دورة من دوراتها أولا يفي بضبط الاختلاف والتفاوت أعصارنا وكذا القول في جميع الممثلات والحوامل والدواوين وكذا اعترافهم بأنه يمكن أن يكون الثوابت متوزعة على أمثلاك الكواكب المتفقة في الحركة بحيث يكون بعض على أمثلاك وبعض آخر على أمثلاك أخر وهكذا الى غير ذلك وتساهلهم في أمور المساحة بوجوه وغيرها لا لجهلهم بل للعجز عن ادراك مخلوقاته بكيفياتها وكمياتها ومن رام ادراك الحقيقة فيها كمن في نفسه الأمير وهو كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وهؤلاء المحققون الصديقون مع ذلك ما قصروا في استخراج ما أدركوه فانه في غاية الجودة والحسن واللطف يزري عن شائبة الجهل والتكلف والعنف لانهم اجتهدوا واسلكوا طريقا سهلا لو منه ما هو المقصود من الصناعة بالذات اجمالا وهو معرفة لطايف مخلوقاته أعني عجايب عزة جمال مبدع المجردات وصانع المادیات من الأرض والسموات فليفهمه الطالب بقدر ما يمكنه بالتدقيق لاجل آخرته وتوجهه

اليها وهو سايق في الطريق فانه يفيد فيها سعادات دنيوية و
لذات لذيذة بهية اما يريد هو ان يكون من الذين يفكرون
فليتأمل في تلطيف اعمال بطليموس وغيره تصديقا لهذا القول
كيف استخرج مقادير ابعاد السموات واجرامها وما سواهما
بطريق امكن للبشر فسلك به فوق الفرقدين وفرق السهى
المسلم عند صاحب الفن من ذوي البصيرة والذهن فلذلك قتل
عشق بطليموس السماء فجعل الخسوف سلما وصعد به اليها وكذلك
في تدقيق اعمال مساحة الارض وغيرها ثم ينبغي ان لن يبادر
بسبب ادراك مثل هذه الجزئيات بانه حكيم ولا يتبختر اذا انتهى فيها
ويدرس بانه عليم ليلا يصير هدف طعن الحق بالملام ولا ينزجر
ولا يناذي بين الانام بالانام وعلى هذا المعنى نبه المحقق الكامل
المحسن المكمل فقال شعر

ولا تك ممن طبسته دروسه ٭ بحيث استقلت عقله واستفزت
فمه وراء العقل علم يدق عن ٭ مدارك غايات العقول السليمة

اللهم افض على قلوبنا لوامع بركاتك وشوارق انوارك وارزقنا
في جميع الاطوار انتباهك واهدنا الى الحقايق والمستعدين من عبادك
بفضلك التام وكرمك العام يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين

وسلم كثيرا والحمد لولي الحمد
جامع هذا المختصر العبد الحقير الفقير عبيد
الله الغالب حسن بن ابي طالب المدعو
بابن المحاسن البيهقي الخراساني اصلح
الله شانه وصانه عما شانه وجعل عواقب
اموره في الدارين خيرا آمين رب
العالمين بحق محمد وآله اجمعين
الطيبين الطاهرين

١٣٥
پيرقا
صحيفا
٧٠

رحل شرابي مرتحله من شمسه وترحرت بعطارد الاقمار